Инструкция по применению
Мирофурил капсулы 200 мг 14 шт



Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Обнинская химико-фармацевтическая компания
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нифуроксазид
Количество в упаковке: 14
Дозировка действующего вещества: 200 мг

Описание

Твердые желатиновые капсулы № 0, корпус и крышечка белого цвета. Содержимое капсул - порошок желтого цвета или порошок желтого цвета с включениями в виде небольших кусочков спрессованной массы, или спрессованный порошок желтого цвета, который рассыпается при легком нажатии.

Действующее вещество

Нифуроксазид

Состав

Состав на одну капсулу: Активное вещество: Нифуроксазид 200,000 мг Вспомогательные вещество: Сахароза 71,000 мг Крахмал кукурузный 68,000 мг Целлюлоза микрокристаллическая 9,000 мг Магния стеарат 2,000 мг Оболочка капсулы: Желатин 94,080 мг Титана диоксид (Е171) 1,920 мг

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

После перорального применения нифуроксазид практически не всасывается из пищеварительного тракта и свое антибактериальное действие оказывает исключительно в просвете кишечника. Нифуроксазид выводится кишечником: 20% в неизмененном виде а остальное количество нифуроксазида - химически измененным.

Показания

Острая бактериальная диарея протекающая без ухудшения общего состояния повышения температуры тела интоксикации.

Способ применения и дозы

Внутрь. Терапия нифуроксазидом не должна продолжаться более 7 дней. Капсулы 200 мг: Взрослым и детям старше 6 лет препарат назначают по 1 капсуле (200 мг) 4 раза в сутки суточная доза - 800 мг. Детям 3 - 6 лет препарат назначают 1 капсулу (200 мг) 3 раза в сутки суточная доза - 600 мг. Если в течение первых трех дней приема улучшения не наступило то следует обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к производным нитрофурана или другим компонентам препарата, - непереносимость фруктозы синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции или недостаточность сахаразы и изомальтазы, - беременность, - детский возраст до 3-х лет (для данной лекарственной формы).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности противопоказано. Нифуроксазид не абсорбируется из ЖКТ и не попадает в системное кровообращение однако применение препарата в период лактации возможно только по строгим показаниям при этом следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Побочные действия

Аллергические реакции (сыпь крапивница отек Квинке анафилактический шок) тошнота рвота. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции сообщите об этом врачу.

Передозировка

Препарат не абсорбируется из ЖКТ и не попадает в системное кровообращение. Симптомы передозировки не известны. В случае превышения дозы рекомендуется промывание желудка и симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Нет данных о том что нифуроксазид вступает во взаимодействие с другими лекарственными средствами. При одновременном приеме с этанолом возможно развитие дисульфирамоподобной реакции (боль в животе тошнота рвота головная боль тахикардия нечеткое зрение слабость судороги). Не рекомендуется одновременное применение с препаратами угнетающими функцию центральной нервной системы.

Особые указания

При лечении диареи одновременно с терапией нифуроксазидом необходимо проводить регидратационную терапию (пероральную или внутривенную) в соответствии с состоянием пациента и интенсивностью диареи. Запрещено применение алкоголя во время терапии так как он повышает чувствительность организма к нифуроксазиду. При проявлении симптомов гиперчувствительности (одышка сыпь зуд) следует прекратить прием препарата. В случае бактериальной диареи с признаками системного поражения (ухудшение общего состояния повышение температуры тела симптомы интоксикации или инфекции) следует обратиться к врачу для решения вопроса о применении антибактериальных препаратов системного действия. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Препарат не влияет на психомоторную деятельность и способность управлять транспортом и работать с механизмами.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.