Инструкция по применению
Мисуфер Капсулы 200 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Умифеновир
Количество в упаковке: 20

Описание

Мисуфер, 200 мг, капсулы Твердые желатиновые капсулы № 0 с корпусом и крышечкой белого цвета. Содержимое капсул - смесь, содержащая гранулы и порошок от белого до светло-желтого цвета.

Действующее вещество

Умифеновир

Состав

Препарат Мисуфер содержит: Действующим веществом является умифеновир. Мисуфер, 200 мг, капсулы Каждая капсула содержит 200 мг умифеновира гидрохлорида (в виде моногидрата). Прочими вспомогательными веществами являются целлюлоза микрокристаллическая, крахмал картофельный, повидон К 30, кремния диоксид коллоидный (аэросил), кальция стеарат, кроскармеллоза натрия, Капсула твердая желатиновая [состав корпуса капсулы: титана диоксид (Е 171), желатин, состав крышечки капсулы: титана диоксид (Е 171), желатин].

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Препарат Мисуфер применяется у взрослых и детей в возрасте от 6 лет для: профилактики и лечения: грипп А и В, другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), комплексной терапии рецидивирующей герпетической инфекции, профилактики послеоперационных инфекционных осложнений. Препарат Мисуфер применяется для комплексной терапии острых кишечных инфекций ротавирусной этиологии у детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки или медицинской сестры. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом, или работником аптеки, или медицинской сестрой. Рекомендуемая доза Взрослые: Показание Схема приема препарата Неспецифическая профилактика в период эпидемии гриппа и других ОРВИ 200 мг (1 капсула по 200 мг или 2 капсулы по 100 мг) 2 раза в неделю в течение 3-х недель. Неспецифическая профилактика при непосредственном контакте с больными гриппом или другими ОРВИ 200 мг (1 капсула по 200 мг или 2 капсулы по 100 мг) 1 раз в день в течение 10-14 дней. Лечение гриппа и других ОРВИ 200 мг (1 капсула по 200 мг или 2 капсулы по 100 мг) 4 раза в сутки (каждые 6 часов) в течение 5 суток. Комплексная терапия рецидивирующей герпетической инфекции 200 мг (1 капсула по 200 мг или 2 капсулы по 100 мг) 4 раза в сутки (каждые 6 часов) в течение 5-7 суток, затем 200 мг (1 капсула по 200 мг или 2 капсулы по 100 мг) 2 раза в неделю в течение 4-х недель. Профилактика послеоперационных инфекционных осложнений 200 мг (1 капсула по 200 мг или 2 капсулы по 100 мг) за 2 суток до операции, затем на 2-е и 5-е сутки после операции. Применение у детей и подростков Дети от 6 до 12 лет: Показание Схема приема препарата Неспецифическая профилактика в период эпидемии гриппа и других ОРВИ 100 мг (1 капсула по 100 мг) 2 раза в неделю в течение 3-х недель. Неспецифическая профилактика при непосредственном контакте с больными гриппом или другими ОРВИ 100 мг (1 капсула по 100 мг) 1 раз в день в течение 10-14 дней. Лечение гриппа и других ОРВИ 100 мг (1 капсула по 100 мг) 4 раза в сутки (каждые 6 часов) в течение 5 суток. Комплексная терапия рецидивирующей герпетической инфекции 100 мг (1 капсула по 100 мг) 4 раза в сутки (каждые 6 часов) в течение 5-7 суток, затем 100 мг (1 капсула по 100 мг) 2 раза в неделю в течение 4-х недель. Профилактика послеоперационных инфекционных осложнений 100 мг (1 капсула по 100 мг) за 2 суток до операции, затем на 2-е и 5-е сутки после операции. Комплексная терапия острых кишечных инфекций ротавирусной этиологии 100 мг (1 капсула по 100 мг) 4 раза в сутки (каждые 6 часов) в течение 5 суток). Дети от 12 до 18 лет: Показание Схема приема препарата

Неспецифическая профилактика в период эпидемии гриппа и других ОРВИ 200 мг (1 капсула по 200 мг или 2 капсулы по 100 мг) 2 раза в неделю в течение 3-х недель. Неспецифическая профилактика при непосредственном контакте с больными гриппом или другими ОРВИ 200 мг (1 капсула по 200 мг или 2 капсулы по 100 мг) 1 раз в день в течение 10-14 дней. Лечение гриппа и других ОРВИ 200 мг (1 капсула по 200 мг или 2 капсулы по 100 мг) 4 раза в сутки (каждые 6 часов) в течение 5 суток. Комплексная терапия рецидивирующей герпетической инфекции 200 мг (1 капсула по 200 мг или 2 капсулы по 100 мг) 4 раза в сутки (каждые 6 часов) в течение 5-7 суток, затем разовую дозу 2 раза в неделю в течение 4-х недель. Профилактика послеоперационных инфекционных осложнений 200 мг (1 капсула по 200 мг или 2 капсулы по 100 мг) за 2 суток до операции, затем на 2 и 5 сутки после операции. Комплексная терапия острых кишечных инфекций ротавирусной этиологии 200 мг (1 капсула по 200 мг или 2 капсулы по 100 мг) 4 раза в сутки (каждые 6 часов) в течение 5 суток. При лечении гриппа и ОРВИ возможна сопутствующая симптоматическая терапия, включая прием жаропонижающих препаратов, муколитических и местных сосудосуживающих средств. Прием препарата начинают с момента появления первых симптомов заболевания гриппом или другими ОРВИ, желательно не позднее 3 суток от начала болезни. Путь и (или) способ введения Принимайте препарат Мисуфер внутрь, до приема пищи. Если Вы забыли принять препарат Мисуфер В случае пропуска приема одной дозы препарата, пропущенную дозу следует принять как можно раньше и продолжить курс приема препарата по начатой схеме. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки, или медицинской сестре. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, через 3 дня Вам следует обратиться к врачу.

Противопоказания

Не принимайте препарат Мисуфер: если у Вас аллергия на умифеновир или любые другие компоненты препарата, если Вы беременны (на сроке до 3-х месяцев, то есть в первом триместре беременности), если Вы кормите грудью.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Не применяйте Мисуфер в первом триместре беременности. При необходимости применения Мисуфера во втором и третьем триместрах беременности обязательно проконсультируйтесь с врачом. Не применяйте Мисуфер, если вы кормите грудью.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам Мисуфер может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Нежелательные реакции, которые могут возникнуть при приеме препарата Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000): Аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу. Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или медицинской сестрой. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (смотри ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Мисуфер больше, чем следовало Если Вы приняли большую дозу, чем Вам было назначено, обратитесь к врачу или в местную поликлинику или больницу. Не забудьте взять с собой упаковку лекарства, чтобы врачам было понятно, какое лекарство Вы приняли.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Особые указания

Необходимо соблюдать рекомендованную схему и длительность приема препарата. Если после применения умифеновира в течение трех суток при лечении гриппа или других ОРВИ сохраняется выраженность симптомов заболевания, в том числе высокая температура (38 °С и более), то необходимо обратиться к врачу для оценки обоснованности приема препарата. Дети Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 6 лет (для дозировки 100 мг), от 6 до 12 лет (для дозировки 200 мг) в связи с невозможностью обеспечить режим дозирования. Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения. Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, работника аптеки или медицинской сестры. Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз. Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки. Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции. Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 3 дня Вам следует обратиться к врачу. Мисуфер не влияет на внимательность и скорость реакций и его можно применять людям различных профессий, в том числе требующих повышенного внимания и координации движений (водители транспорта, операторы и так далее).

Условия хранения

Хранить в контурной ячейковой упаковке в пачке, для того чтобы защитить от света, при температуре ниже 25 °С. Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.