Инструкция по применению
Митеравел плюс Капсулы 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Индия
Производитель: Софтгел Хелскеа
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 2



Описание

Регулярное употребление комплекса витаминов и минералов при планировании, во время беременности и лактации способствует развитию здорового ребенка и сохранению здоровья матери, обеспечивая повышенные потребности в них, когда это особенно необходимо. Митеравел плюс Омега -3, 11 витаминов и 8 минералов учитывает суточные потребности в витаминах и минералах беременных и кормящих женщин, женщин детородного возраста. В состав Митеравел Плюс входят витамины и минералы для комплексной заботы о самом дорогом - здоровье будущего малыша и его мамы. ОМЕГА-3 способствуют правильному развитию ребенка Дозогексаеновая кислота в составе Омега-3 необходима для развития и поддержания функций головного мозга и сетчатки глаза. Прием Омега -3 во время беременности, способствует развитию когнитивных способностей будущего малыша А также требуется для правильного протекания беременности, способствуя снижению риска преждевременных родов и предотвращая возникновение послеродовой депрессии. Дозоксаеновая кислота в составе Омега-3 снижает риск развития преэклампсии и артериальной гипертензии у беременных. ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА снижает риск самопроизвольного выкидыша на ранних сроках беременности. Употребление фолиевой кислоты способствует предотвращению возникновения врожденных внутриутробных пороков развития: дефекта нервной трубки и других видов пороков развития, в т. ч. пороков сердца и недоразвития конечностей, связанных с дефицитом поступления фолиевой кислоты во время внутриутробного развития ЙОД необходим для синтеза тиреоидных гормонов и нормальной функции щитовидной железы; участвует в липидном и белковом обмене. Снижает риск возникновения осложнений

во время беременности, развивающихся на фоне дефицита потребления йода, а именно внутриутробной гибели плода и самопроизвольного прерывания беременности. Предупреждает возникновение врожденных внутриутробных пороков развития головного мозга ребенка, нарушений формирования щитовидной железы, опорно-двигательного аппарата, отставания в физическом и умственном развитии. ЖЕЛЕЗО является важной составной частью гемоглобина, обеспечивающего транспорт кислорода к тканям, принимает участие в эритропоэзе. Предупреждает развитие железодефицитной анемии, в том числе во время беременности. СЕЛЕН-микроэлемент, входящий в состав всех клеток организма. Обеспечивает антиоксидантную защиту клеточных мембран и ДНК плода, препятствует образованию свободных радикалов, потенцирует действие витамина Е, необходим для работы иммунной системы. Селен снижает риск преждевременного прерывания беременности, задержки развития плода, преэклампсии, послеродовой депрессии, риск материнской смертности. ХРОМ участвует в метаболизме углеводов, гликемическом контроле, способствует улучшению чувствительности к инсулину. Потребление хрома способствует нормализации уровней глюкозы в крови при нарушении толерантности. У пациентов с глюкозотолерантностью добавки хрома не только улучшают состояние метаболизма глюкозы, но и уменьшают уровень липопротеинов низкой плотности, улучшают атерогенный индекс МОЛИБДЕН необходим для профилактики анемии беременных и профилактики формирования врожденных пороков развития мозга у плода. Применение молибдена может способствовать ослаблению токсикоза - тошноты и рвоты беременных ВИТАМИН В1 (тиамин) - играет важную роль в белковом, углеводном и жировом обмене, а также в работе нервной системы (участвует в процессах проведения нервного возбуждения в синапсах) Во время беременности тиамин снижает риск возникновения врожденных пороков развития у плода. ВИТАМИН В2 (рибофлавин) – важнейший катализатор процессов клеточного дыхания и зрительного восприятия, регулирует окислительно-восстановительные процессы, участвует в тканевом дыхании, углеводном, белковом и жировом обменах, а также в синтезе гемоглобина и эритропоэтина. Способствует нормальному росту и развитию плода. Недостаток рибофлавина во время беременности может привести к возникновению патологии плода: деформации конечностей, расщеплению твердого неба, гидронефрозу, гидроцефалии, врожденным порокам сердца. ВИТАМИН В3 (РР, никотинамид) необходим для активности ферментов биосинтеза АТФ. принимает участие в окислительно-восстановительных процессах, участвует в метаболизме жиров, белков, аминокислот, пуринов, тканевом дыхании, гликогенолизе Нормализует общее физическое состояние организма; является жизненно-важным витамином для поддержания здоровой кожи; уменьшает боли и улучшает подвижность суставов при остеоартрите; оказывает мягкое седативное действие и полезен при лечении

эмоциональных и психических расстройств, включая мигрень, тревогу, депрессию, снижение внимания; улучшает микроциркуляцию крови; оказывает слабое антикоагулянтное воздействие ВИТАМИН B6 (пиридоксин) - участвует в обмене веществ; необходим для нормального функционирования центральной и периферической нервной системы. Предупреждает развитие тошноты и рвоты при токсикозе беременных. Восполняет дефицит пиридоксина, который может возникать в случае приема пероральных контрацептивов до беременности. Способствует повышению всасывания магния в кишечнике. ВИТАМИН B7 (Биотин, Витамин H) принимает участие в процессах катаболизма жиров и углеводов, синтеза АТФ, способствует улучшению состояния кожи, ногтей и волос. ВИТАМИН B12 (цианокобаламин) - участвует во многих процессах обмена веществ, необходим для синтеза ДНК. Цианокобаламин участвует в образовании миелина, компонента оболочки нервных волокон; при дефиците цианокобаламина во время беременности у плода может замедляться процесс формирования миелиновой оболочки нервов. Повышает устойчивость эритроцитов к гемолизу. Повышает способность тканей к регенерации. ВИТАМИН C (аскорбиновая кислота) участвует в регулировании окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей; повышает устойчивость организма к инфекциям. Снижает риск преждевременного отслоения плаценты и преждевременного отхождения вод при родах. Прием аскорбиновой кислоты беременными снижает риск инфекций мочеполовой системы более чем в 2 раза. ВИТАМИН D3 (холекальциферол) способствует абсорбции кальция в кишечнике и поддерживает необходимые уровни кальция и фосфатов в крови для обеспечения минерализации костной ткани. Он также необходим для роста костей и процесса костного ремоделирования. Достаточный уровень витамина D предотвращает развитие рахита у детей и остеомаляции у взрослых. Восполнение дефицит витамина D во время беременности снижает риск преэклампсии, инфекций, преждевременных родов, кесарева сечения, гестационного диабета. ВИТАМИН E (альфа-токоферол) обладает антиоксидантным действием, участвует в процессах тканевого дыхания, метаболизме белков, жиров и углеводов. Способствует нормальному росту и развитию плода, снижает риск возникновения артериальной гипертензии во время беременности. Снижает риск отслойки плаценты. МЕДЬ необходима для нормального усвоения железа, формирования соединительной ткани, клеток крови. Дефицит меди провоцирует развитие нарушений дыхания у новорожденных. Восполнение дефицита меди уменьшает риск нарушения формирования сердечно-сосудистой системы, скелета, коллагена и эластина. МАГНИЙ уменьшает возбудимость нервных клеток, участвует во многих ферментативных реакциях. Магний принимает участие в формировании мышечной и костной тканей, а также в синтезе белка. Потребление магния снижает риск возникновения повышенного тонуса матки, самопроизвольного аборта, аномалий развития плода.

ЦИНК участвует в метаболизме и стабилизации клеточных мембран. Входит в состав основных ферментов, участвует в различных биохимических реакциях. Цинк стимулирует процессы регенерации кожи и рост волос, а также оказывает иммуномодулирующее действие. Цинк участвует в делении и дифференцировке клеток, что обуславливает высокую чувствительность плода к дефициту цинка на ранних этапах развития. Необходим для поддержания нормального развития тканей плода. КАРАТИНОИДЫ более безопасный предшественник витамина А, исключающий токсичное действие на организм. Участвует в антиоксидантной защите организма. Необходимы для роста костей, нормальной репродуктивной функции, для регуляции деления и дифференцировки эпителия, а также для нормальной функции сетчатой оболочки глаза, принимают участие в формировании органа зрения и скелета во время внутриутробного развития плода.

Состав

На 1 капсулу: Рыбий жир (600 мг), с содержанием докозагексаеновой кислоты 240 мг, эйкозапентаеновой кислоты 60 мг, капсула (желатин из шкур КРС, Е422, Е420, Е297, Е172, ароматизатор шоколадная ваниль (растительное масло, вкусоароматические компоненты, Е218), магния оксид, рафинированное соевое масло, аскорбиновая кислота, железа фумарат, гидрогенизированное растительное масло, пчелиный воск Е901, цинка сульфат, Е322, Е551, альфа-токоферола ацетат, никотинамид, ароматизатор шоколадная ваниль (растительное масло, вкусоароматические компоненты), натураль- ная смесь каротиноидов, меди сульфат, пиридоксина гидрохлорид, тиамина гидрохло- рид, рибофлавин, фолиевая кислота, цианокобаламин, калия иодид, хрома пиколинат, натрия молибдат, натрия селенат, Е320, Е321, биотин, холекальциферол.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Для реализации через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети в качестве биологически активной добавки к пище – источника полиненасыщенных жирных кислот омега-3, в том числе докозагексаеновой кислоты, дополнительного источника витаминов и минеральных веществ для женщин: в период планирования беременности, во время беременности (1, 2, 3 триместры), в период кормления грудью.

Способ применения и дозы

Принимать по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, запивая водой.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, состояния, при которых противопоказаны препараты йода. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом, лицам с заболеваниями щитовидной железы рекомендуется проконсультироваться с врачом-эндокринологом.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 С.