Инструкция по применению
Эвалар Мизол Раствор для наружного применения 1 % 10 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нафтифин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%



Описание

Противогрибковое лекарственное средство Грибковые заболевания – одна из наиболее актуальных и не до конца решенных задач современной медицины. По данным ВОЗ, каждый пятый житель планеты сталкивается с грибковыми инфекциями. Нафтифин – противогрибковое средство, устраняющее грибковые поражения с кожи и ногтей. Кроме того, нафтифин обладает противовоспалительным действием, которое способствует быстрому исчезновению симптомов воспаления, особенно зуда. Нафтифин быстро проникает в кожу, создавая устойчивые противогрибковые концентрации в различных ее слоях. Мизол Эвалар лечит: грибковые инфекции кожи и кожных складок; межпальцевые микозы; грибковые инфекции ногтей; кандидозы кожи; разноцветный (отрубевидный) лишай; дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него).

Действующее вещество

Нафтифин

Состав

2 мл раствора содержит Действующее вещество: нафтифина гидрохлорид – 10,00 мг Вспомогательные вещества: пропиленгликоль – 50,00 мг, этанол (этиловый спирт) 95 % – 400,00 мг, вода очищенная – 475,00 мг.

Форма выпуска

Раствор

Показания

грибковые инфекции кожи и кожных складок (tinea corporis, tinea inguinalis), межпальцевые микозы (tinea manum, tinea pedum), грибковые инфекции ногтей (онихомикозы), кандидозы кожи, разноцветный (отрубевидный) лишай, дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него).

Способ применения и дозы

Наружно. Мизол® Эвалар наносят 1 раз в день на пораженную поверхность кожи и соседние с ней участки (приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения) после их тщательной очистки и высушивания. Длительность терапии при дерматомикозах – 2-4 недели (при необходимости – до 8 недель), при кандидозах – 4 недели. При поражении ногтей Мизол® Эвалар наносят 2 раза в день на пораженный ноготь. Перед первым применением препарата максимально удаляют пораженную часть ногтя ножницами или пилкой для ногтей. Длительность терапии при онихомикозах – до 6 месяцев. Для предотвращения рецидива лечение следует продолжить в течение минимум 2 недель после исчезновения клинических симптомов. Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Противопоказания Гиперчувствительность к нафтифину или пропиленгликолю. Беременность и период грудного вскармливания (безопасность и эффективность применения не установлены). Противопоказано нанесение препарата на раневую поверхность. С осторожностью Детский возраст (опыт клинического применения ограничен). Применение при беременности и в период грудного вскармливания Применение препарата Мизол® Эвалар во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (безопасность и эффективность нафтифина у данной категории пациентов не изучена). Побочное действие В отдельных случаях могут наблюдаться местные реакции: сухость кожи, гиперемия кожи и жжение. Побочные эффекты носят обратимый характер и не требуют отмены лечения. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу. Передозировка При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При случайном приеме внутрь показано промывание желудка, симптоматическая терапия. Взаимодействие с другими лекарственными средствами Взаимодействие с другими лекарственными средствами не изучалось. Особые указания Препарат Мизол® Эвалар не предназначен для применения в офтальмологии. Не следует допускать попадания препарата в глаза. Для достижения терапевтического эффекта требуется курсовое лечение. Мизол® Эвалар эффективен при лечении микозов, поражающих области кожи с гиперкератозом, а также в зонах роста волос. Пропиленгликоль, входящий в состав раствора, может вызывать раздражение кожи, при появлении побочных эффектов необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Мизол® Эвалар не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания Применение препарата Мизол® Эвалар во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (безопасность и эффективность нафтифина у данной категории пациентов не изучена).

Побочные действия

В отдельных случаях могут наблюдаться местные реакции: сухость кожи, гиперемия кожи и жжение. Побочные эффекты носят обратимый характер и не требуют отмены лечения. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При случайном приеме внутрь показано промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не изучалось.

Особые указания

Препарат Мизол® Эвалар не предназначен для применения в офтальмологии. Не следует допускать попадания препарата в глаза. Для достижения терапевтического эффекта требуется курсовое лечение. Мизол® Эвалар эффективен при лечении микозов, поражающих области кожи с гиперкератозом, а также в зонах роста волос. Пропиленгликоль, входящий в состав раствора, может вызывать раздражение кожи, при появлении побочных эффектов необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок хранения после открытия

3

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.