Инструкция по применению
Мятные Таблетки для рассасывания 500 мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: МОСКОВСКАЯ ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мяты перечной масло
Количество в упаковке: 1



Описание

Таблетки белого цвета слегка мраморные с запахом масла мяты перечной, круглые, плоскоцилиндрической формы с фаской с двух сторон и риской с одной стороны.

Действующее вещество

Мяты перечной масло

Состав

Состав на одну таблетку: Активный компонент: Мяты перечной листьев масло (мяты перечной масло) - 2,5 мг Вспомогательные вещества: Кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 25,0 мг Кальция стеарат - 5,8 мг Метилцеллюлоза - 0,6 мг Сахар белый - 566,1 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания

Применяют в качестве симптоматического средства при тошноте, рвоте, спастических болях органов желудочно-кишечного тракта.

Способ применения и дозы

Применяют по 1-2 таблетки 3-4 раза в сутки. Таблетки держат во рту до полного рассасывания. Максимальная суточная доза - 8 таблеток. Курс лечения без консультации врача - 3 дня. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность и период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не подтверждены).

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применение при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных исследований.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, раздражение слизистой оболочки полости рта. При возникновении побочных реакций применение препарата следует прекратить. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Ослабляет действие гомеопатических лекарственных средств. Если Вы принимаете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов, необходимо учитывать, что в одной таблетке содержится около 0,59 г углеводов (0,05 ХЕ). Пациентам с желчекаменной болезнью следует соблюдать осторожность при приеме препарата, поскольку он обладает желчегонным действием.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.