Инструкция по применению
Млекоин Гранулы гомеопатические 10 г

Характеристики

Форма выпуска: Гранулы
Страна: Россия
Производитель: МАТЕРИА МЕДИКА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Действующее вещество: Pulsatilla pratensis, Pulsatilla (Пулсатилла пратенсис, Пулсатилла) C200; Vitex agnus castus, Agnus-castus (Витекс агнус-кастус, Агнус-кастус) C50; Urtica urens (Уртика уренс) C200 - 10000 мг

Форма выпуска

Гранулы

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания

Препарат Млекоин назначают при:- ранней гипогалактии;- поздней гипогалактии;- агалактии;- застойных явлениях в молочных железах.

Способ применения и дозы

При снижении лактации, ее отсутствии рекомендован прием гранул в утреннее и вечернее время. Одноразовая дозировка – 5 гранул. Их кладут под язык и неспешно рассасывают до растворения. Принимать их рекомендуют перед едой.

Противопоказания

Препарат Млекоин не назначают при гиперчувствительности к компонентам гранул.

Применение при беременности и кормлении грудью

В период лактации принимают по показаниям.

Побочные действия

Использование препарата Млекоин может сопровождаться: аллергическими реакциями; ухудшением лактации в начале приема.

Передозировка

Теоретически почти невозможно передозировать гомеопатические гранулы.

Взаимодействие с другими препаратами

Случаев отрицательного взаимодействия с другими препаратами официально не зарегистрировано. Как и другие гомеопатические препараты, гранулы Млекоин не рекомендовано принимать одновременно с кофеин- и никотинсодержащими средствами, так как они снижают эффективность гранул.

Условия хранения

В сухом месте