Инструкция по применению
Мойстана Суппозитории вагинальные 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Валента Фарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Суппозитории вагинальные «Мойстана®» (далее – Мойстана®) – твердые овальные, конусообразные изделия от белого до кремового цвета, помещенные в блистер из ПВХ /ПЭ, представляют собой медицинское изделие, разработанное для женщин и предназначенное для местного применения во влагалище. Блистер с суппозиториями разделен на слоты с помощью перфорации для удобства использования. Вагинальные суппозитории помещены в слоты, и, при применении, слоты отделяются друг от друга по линии перфорации так, чтобы отделить один слот с изделием от блистера. Суппозиторий извлекается из слота путем разделения листов пленки.После введения суппозитория во влагалище, он размягчается и образует увлажняющий и защитный гель.

Состав

1 суппозиторий содержит:10 мг гиалуроновой кислоты в виде натриевой соли,5 мг молочной кислоты и твердый жир в виде основы.

Форма выпуска

Суппозитории

Показания

Суппозитории вагинальные могут быть рекомендованы при состояниях, сопровождающихся сухостью слизистой оболочки влагалища и ее атрофией.Сухость слизистой оболочки влагалища возникает в связи с возрастными изменениями, вследствие дефицита эстрогенов, в случае гормональной терапии и использовании контрацептивов, после родов и гинекологических или хирургических процедур, а также атрофии слизистой оболочки в результате химиотерапии или лучевой терапии. Суппозитории вагинальные способствуют восстановлению и поддержанию нормального состояния слизистой оболочки, уменьшают и предотвращают осложнения, возникающие в вульве и влагалище вследствие сухости слизистой оболочки, сопровождающихся зудом, покраснением, воспалением, увлажняют слизистую во время интимной близости и снижают дискомфорт при болевых ощущениях во время полового акта.

Способ применения и дозы

Изделие предназначено только для вагинального применения.Если суппозиторий слишком мягкий, положите его на несколько минут в холодильник перед тем, как извлечь его из блистера.Перед введением вагинального суппозитория тщательно вымойте руки.Отделите один слот с суппозиторием от блистера. Захватите каждый слой пленки (большим и указательным пальцами) и медленно отделите их друг от друга. Аккуратно выньте суппозиторий из слота. Осторожно введите суппозиторий пальцем глубоко во влагалище. Лучше вводить суппозиторий лежа на спине со слегка приподнятыми бедрами.Если врач не назначит иную схему, вводите один суппозиторий перед сном.Суппозитории вагинальные надо применять непрерывно в течение 14-20 дней. В качестве монотерапии не используйте изделие дольше 20 дней. Применение вагинальных суппозиториев надо планировать так, чтобы оно не прерывалось из-за менструации.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Особые указания

Изделие предназначено только для вагинального применения! Не глотать! Не используйте изделие во время менструации. Не превышайте рекомендуемый курс лечения. Не используйте изделие в случае аллергии на любые ингредиенты. Прекратите применение суппозиториев и обратитесь к врачу в случае значительных изменений, экземы, припухлости и других, ранее не существовавших, проблем в области наружных половых органов. Проконсультируйтесь с врачом, если через 14 дней непрерывного применения симптомы не уменьшились или повторились снова после окончания курса. Не начинайте повторный курс применения без консультации с врачом. Не используйте вместе с другими изделиями для вагинального применения. В результате использования этого изделия на белье могут появиться пятна, которые трудно удаляются, поэтому рекомендуется пользоваться прокладками в течение курса применения. Возможно взаимодействие между компонентами изделия и латексными презервативами. Поэтому не используйте латексные презервативы во время применения вагинальных изделий. Не следует использовать, если повреждена первичная упаковка.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С.