Инструкция по применению
Моксонидин-Алиум Таблетки 200 мкг 90 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Биннофарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Моксонидин
Количество в упаковке: 90
Дозировка действующего вещества: 0,2 мг



Описание

Моксонидин-Алиум, 200 мкг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета. На изломе таблетки белого или почти белого цвета. Допускается шероховатость поверхности таблеток.

Действующее вещество

Моксонидин

Состав

Препарат Моксонидин-Алиум содержит Действующим веществом является моксонидин. Моксонидин-Алиум. 200 мкг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой Каждая таблетка содержит 0,2 мг моксонидина. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: лактозы моногидрат, повидон, кросповидон, магния стеарат, поливиниловый спирт, макрогол, тальк, титана диоксид. Моксонидин-Алиум, 300 мкг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой Каждая таблетка содержит 0,3 мг моксонидина. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: лактозы моногидрат, повидон, кросповидон, магния стеарат, поливиниловый спирт, макрогол, титана диоксид, тальк, краситель железа оксид желтый. Моксонидин-Алиум, 400 мкг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой Каждая таблетка содержит 0,4 мг моксонидина. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: лактозы моногидрат, повидон, кросповидон, магния стеарат, поливиниловый спирт, макрогол, титана диоксид, тальк, краситель железа оксид желтый, краситель железа оксид красный.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат Моксонидин-Алиум предназначен для лечения артериальной гипертензии у взрослых пациентов старше 18 лет. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом. Рекомендуемая доза В большинстве случаев начальная доза препарата составляет 200 мкг в сутки. Обычно препарат принимают 2 раза в день. За один раз можно принять не более 400 мкг, а за один день - не более 600 мкг. Лечащий врач будет подбирать необходимую Вам дозу, ориентируясь на то, как Вы реагируете на препарат. В некоторых случаях препарат будут назначать в наименьших дозах, например при почечной недостаточности, или в случае, если Вам проводят процедуру, называемую гемодиализом. Путь и (или) способ введения Препарат принимают внутрь независимо от приема пищи. Если Вы забыли принять препарат Моксонидин-Алиум Если Вы забыли принять дозу в обычное время, примите препарат сразу, как вспомните об этом. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Противопоказания

Не принимайте препарат Моксонидин-Алиум: если у Вас аллергия на моксонидин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша), ангионевротический отек в анамнезе, если у Вас нарушена проводимость сердца (синдром слабости синусового узла или синоатриальная блокада сердца), если у Вас тяжелая печеночная недостаточность, если у Вас заметно снижена частота сердечных сокращений (менее 50 ударов в минуту), если у Вас нарушено проведение электрических импульсов в сердце (атриовентрикулярная блокада II или III степени), если у Вас острая или хроническая сердечная недостаточность (III и IV функциональный класс по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA)).

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Применение препарата Моксонидин-Алиум противопоказано во время беременности и кормления грудью.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. При возникновении следующих серьезных нежелательных реакций прекратите прием препарата и немедленно обратитесь к врачу: Нечастые - могут возникать не более чем у 1 человека из 100: выраженное снижение артериального давления, внезапное понижение артериального давления вследствие изменения положения тела (ортостатическая гипотензия), ангионевротический отек (отек Квинке), обморок, уменьшение частоты сердечных сокращений до 60 ударов в минуту (брадикардия). Сообщите лечащему врачу, если заметите любую из следующих нежелательных реакций: Нечастые - могут возникать не более чем у 1 человека из 100: периферические отеки, боль в области шеи, повышенная возбудимость, звон в ушах. Частые нежелательные реакции - могут возникать не более чем у 1 человека из 10: сухость слизистой оболочки полости рта, головокружение (вертиго), головная боль, сонливость, бессонница, понос (диарея), тошнота, рвота, нарушение пищеварения (диспепсия), кожный зуд, кожная сыпь, боль в спине, астения (повышенная утомляемость, слабость, эмоциональная неустойчивость).

Передозировка

Если Вы приняли препарата Моксонидин-Алиум больше, чем следовало Прием высоких доз препарата может вызвать головную боль, слабость, чувство усталости, сонливость, снижение артериального давления, головокружение, снижение частоты сердечных сокращений до 60 ударов в минуту (брадикардию), сухость во рту, рвоту, боль в верхней части живота, угнетение дыхания и нарушение сознания. Кроме того, возможно также кратковременное повышение артериального давления, увеличение частоты сердечных сокращений (тахикардия) и увеличение содержания сахара в крови (гипергликемия). Если Вы приняли препарата Моксонидин-Алиум больше, чем следовало, немедленно обратитесь к врачу: Вам может потребоваться медицинская помощь. По возможности покажите врачу упаковку препарата Моксонидин-Алиум.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Это особенно важно, если Вы принимаете: другие гипотензивные средства (препараты, снижающие артериальное давление), в том числе так называемые бета-адреноблокаторы, трициклические антидепрессанты (лекарственные препараты, предназначенные для лечения депрессии), транквилизаторы (препараты для лечения тревожных расстройств), седативные (успокоительные) и снотворные средства, в том числе так называемые производные бензодиазепина (например, лоразепам). Моксонидин выделяется почками. Если Вы принимаете лекарственные средства, которые также выделяются почками, между ними и моксонидином возможны взаимодействия, влияющие на эффективность и безопасность лечения.

Особые указания

Во время лечения препаратом Моксонидин-Алиум регулярно контролируйте артериальное давление. Дети и подростки Не давайте препарат детям от 0 до 18 лет, поскольку безопасность и эффективность применения лекарственного препарата Моксонидин-Алиум у детей и подростков не установлены. Данные отсутствуют. Препарат Моксонидин-Алиум с пищей, напитками и алкоголем Моксонидин может усиливать угнетающее действие алкоголя на нервную систему. Не употребляйте алкоголь во время лечения препаратом Моксонидин-Алиум. Препарат Моксонидин-Алиум содержит лактозы моногидрат Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного препарата.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Исследования влияния препарата на способность управлять автомобилем и другими механизмами не проводились. Моксонидин может вызывать сонливость и головокружение (см. раздел 4). Убедитесь, что Вы не испытываете подобных реакций, прежде чем управлять транспортным средством или работать с механизмами.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Хранить препарат при температуре не выше 25 °С.