Инструкция по применению
Моночинкве Ретард Капсулы 50 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Италия
Производитель: Berlin-Chemie
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Изосорбида мононитрат
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 50 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Изосорбида мононитрат

Состав

Изосорбид-5-мононитрат 50 мг Вспомогательные вещества: сахароза, крахмал кукурузный, этилцеллюлоза, стеариновая кислота, тальк, краситель красный 4R (E124), хинолин желтый (E104), титана диоксид, желатин. 15 шт. - блистеры (2) - коробки картонные.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Профилактика и длительная терапия стенокардии III-IV функциональных классов. Восстановительное лечение после перенесенного инфаркта миокарда.Лечение хронической сердечной недостаточности (в составе комбинированной терапии).

Способ применения и дозы

Моночинкве ретард назначают по 50 мг (1 капс.) 1 раз/сут утром после еды, не разжевывая и запивая небольшим количеством жидкости. Дозу следует корректировать в зависимости от состояния пациента.

Противопоказания

Острые нарушения кровообращения (шок, сосудистый коллапс). Геморрагический инсульт. Острая стадия инфаркта миокарда. Одновременный прием ингибиторов фосфодиэстераз (силденафил). Выраженная артериальная гипотензия (систолическое ад<90 мм рт.ст., диастолическое ад<60 мм рт.ст.). Состояния после черепно-мозговой травмы. Закрытоугольная глаукома. Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Возраст до 18 лет. Повышенная чувствительность к органическим нитратам.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности препарат может быть назначен только по строгим показаниям, когда ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск для плода. Если существует необходимость применения препарата в период лактации, то грудное вскармливание необходимо прекратить.

Побочные действия

При приеме Моночинкве ретард в рекомендуемой дозе Побочное эффекты не описаны.Однако, как и при применении других нитратов, возможно:Со стороны сердечно-сосудистой системы в начале лечения - нитратная головная боль, которая обычно уменьшается через несколько дней при продолжении терапии. после первого приема или после увеличения дозы - артериальная (в т.ч. ортостатическая) гипотензия, сопровождающаяся тахикардией, головокружением, слабостью.Со стороны пищеварительной системы очень редко - тошнота, рвота.Дерматологические реакции очень редко – покраснение лица и кожные аллергические реакции.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось. Однако при возникновении симптомов передозировки рекомендуются общепринятые меры: вызвать рвоту, промыть желудок. Необходимо контролировать, не принимал ли пациент одновременно еще какие-либо лекарства, следить за параметрами гемодинамики.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном приеме Моночинкве ретард с другими вазодилататорами, антигипертензивными препаратами, бета-адреноблокаторами, блокаторами кальциевых каналов, антипсихотическими препаратами, трициклическими антидепрессантами, силденафилом, этанолом возможно потенцирование гипотензивного эффекта Моночинкве ретард.

Особые указания

Препарат не применяют для купирования приступов стенокардии. При артериальной гипертензии препарат применятся только под контролем врача. Препарат назначают как в виде монотерапии, так и в комбинации с бета-адреноблокаторами, блокаторами кальциевых каналов, ингибиторами АПФ, сердечными гликозидами или диуретиками. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами: При приеме препарата возможно снижение способности к концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, в связи с чем не рекомендуется управление транспортными средствами и занятия другими потенциально опасными видами деятельности.

Условия хранения

В сухом месте