Инструкция по применению
Монтавит Гель вагинальный 20 г

Характеристики



Форма выпуска: Гель
Страна: Австрия
Производитель: Montavit
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гидроксиэтилцеллюлоза
Количество в упаковке: 1

Описание

Нарушения состава влагалищного секрета и снижение количества его образования может происходить во время менопаузы, после различных операций на матке и яичниках, молодые женщины могут сталкиваться с этой проблемой в стрессовый ситуациях (вагинизм). Все вышеперечисленное может приводить к появлению сухости слизистой оболочки влагалища, появлению на ней микротрещин. Это вызывает дискомфорт, чувство жжения, нарушения полового акта в виде затруднения проникновения во влагалище, напряжения, неприятных болезненных ощущений. Монтавит восполняет дефицит естественного влагалищного секрета, оказывая увлажняющее и смазывающее действие при равномерном распределении на стенках влагалища; хорошо переносится слизистой оболочкой, не содержит жиров и совместим с латексом.

Действующее вещество

Гидроксиэтилцеллюлоза

Состав

Действующее вещество: гидроксиэтилцеллюлоза. Вспомогательные вещества: глицерин - 100 мг; очищенная вода - 876,9 мг; хлоргексидина дигидрохлорид - 0,1 мг. Концентрация действующего вещества (мг): 23 мг.

Форма выпуска

Гель

Показания

При нарушениях состава влагалищного секрета, снижение количества образования секрета. В некоторых случаях возможно применение Монтавит при проведении гинекологических вмешательств, связанных с введением инструментов во влагалище.

Способ применения и дозы

Перед осуществлением полового акта нанести небольшое количество Монтавит на отверстие влагалища. Для борьбы с сухостью влагалища доза и частота применения определяется женщиной индивидуально.

Противопоказания

Применение Монтавита противопоказано при аллергических реакциях на данный гель, при глубоких поражениях слизистой оболочки влагалища, воспалительных заболеваниях влагалища.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Монтавит может послужить причиной возникновения аллергических реакций, местного раздражения слизистых и кожных покровов, появление чувства зуда и жжения в месте нанесения.

Передозировка

Передозировка препарата не описана.

Взаимодействие с другими препаратами

Монтавит нейтрален и хорошо совместим в с водорастворимыми веществами.

Особые указания

Монтавит не является противозачаточным средством, может использоваться с презервативами, легко смывается, не оставляет пятен.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.