Инструкция по применению
Монтевизин Капли глазные 0,05 % 10 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Черногория
Производитель: Хемомонт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тетризолин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.0005
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Тетризолин

Состав

Состав на 1 мл: Действующее вещество: тетризолина гидрохлорид – 0,5 мг, вспомогательные вещества – бензалкония хлорид, динатрия эдетата дигидрат, натрия хлорид, борная кислота, натрия тетрабората декагидрат, вода для инъекций.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

При местном применении практически не всасывается.

Показания

Отек и гиперемия конъюнктивы при аллергических заболеваниях глаз или обусловленные воздействием химических или физических факторов (дым, пыль, хлорированная вода, свет, косметические средства, контактные линзы).

Способ применения и дозы

Местно. По 1-2 капле в каждый конъюнктивальный мешок 2-3 раза в день. Если улучшение не наступило в течение 48 часов, дальнейшее применение необходимо прекратить и обратиться к врачу.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, глаукома, детский возраст до 2 лет, эндотелиально-эпителиальная дистрофия роговицы.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение при беременности и в период грудного вскармливания, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Мидриаз, повышение внутриглазного давления, реактивная гиперемия, слезотечение, ощущение жжения в глазу, боль в глазу, покалывание в глазу, затуманивание зрения. Возможны системные эффекты: головная боль, тошнота, сонливость, слабость, тремор, головокружение, бессонница, сердцебиение, тахикардия, гипергликемия, повышение артериального давления, нарушения деятельности сердца, аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы: мидриаз, цианоз, лихорадка, судороги, аритмии, повышение артериального давления, отек легких, диспноэ, остановка сердца. Избыточное общее всасывание производных имидазола может привести к угнетению центральной нервной системы, сопровождающемуся сонливостью, гипотермией, брадикардией, коллапсом, апноэ и комой. Риск появления симптомов передозировки, связанных с всасыванием препарата, высок у маленьких детей, особенно при проглатывании. Лечение: антидот неизвестен. Назначают активированный уголь, промывание желудка, ингаляцию кислорода, жаропонижающие и противоэпилептические средства. Для снижения артериального давления - фентоламин по 5 мг на физиологическом растворе медленно в/в или по 100 мг внутрь.

Взаимодействие с другими препаратами

Несовместим с ингибиторами МАО, трициклическими антидепрессантами, мапротилином (возможность развития гипертензивного криза), ингаляционными анестетиками (напр. циклопропаном, галотаном и другими галогенированными анестетиками, которые могут вызвать фибрилляцию желудочков).

Особые указания

Использовать в течение 28 дней после вскрытия флакона. Следует избегать длительного применения и передозировки, особенно у детей. Если заболевание глаза не является препятствием для ношения контактных линз, их следует снять перед закапыванием препарата и установить примерно через 15 мин. Следует избегать прямого контакта глазных капель с мягкими контактными линзами, учитывая риск нарушения их прозрачности. Если в течение 48 ч состояние не улучшается или раздражение и гиперемия глаз сохраняются или нарастают, следует отменить препарат и обратиться к врачу. При появлении интенсивных болей в глазах, головной боли, потери зрения, внезапном появлении мушек перед глазами, покраснения глаз, боли при воздействии света или двоения в глазах, необходимо немедленно обратиться к врачу.