Инструкция по применению
Монурель ПревиЦист таблетки 920мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Италия
Производитель: Zambon
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 24.0

Состав

Клюквы плодов сухой экстракт в мальтодекстрине - 120 мг кислота аскорбиновая - 60 мг вспомогательные вещества: МКЦ; дикальция фосфат; глицерилбехенат; кроскармеллоза натрия; поливинилполипирролидон; гидроксипропилметилцеллюлоза; магния стеарат; диоксид кремния; краситель диоксид титана (Е171); шеллак; стеариновая кислота; моно- и диглицериды жирных кислот (Е472); поливинилпирролидон; красители: Понсо 4R (Е124) и индигокармин (Е132)

Форма выпуска

Таблетки

Способ применения и дозы

Принимать по одной таблетке один раз в день перед сном после опорожнения мочевого пузыря. Таблетку необходимо запить стаканом воды. Для усиления эффекта антибактериальной терапии при лечении инфекций мочевого пузыря принимать по 1 таб. в день в течение 1 месяца. При часто рецидивирующих циститах (более 3 эпизодов в год)принимать в течение 15 дней каждого месяца в течение 3 месяцев.

Передозировка

Пациентам, принимающим антагонисты витамина К, необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием препаратов, содержащих экстракт клюквы. Для увеличения диуреза необходимо выпивать не менее 2 литров воды в день, особенно пациентам, страдающим мочекаменной болезнью.

Условия хранения

В сухом месте