Инструкция по применению
Мукалтин УБФ Таблетки 50 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Уралбиофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Алтея лекарственного корней экстракт
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 50 мг



Описание

Таблетки от светло-серого до коричневато-серого цвета с вкраплениями или мраморностью, со специфическим запахом, плоскоцилиндрической формы, с фаской и риской. Допускается неоднородность окрашивания поверхности таблеток.

Действующее вещество

Алтея лекарственного корней экстракт

Состав

На одну таблетку Действующее вещество: Алтея лекарственного травы экстракт (Мукалтин) экстракт сухой с содержанием суммы полисахаридов в пересчете на глюкозу 18 % - 0,05 г Вспомогательные вещества: натрия гидрокарбонат - 0,087 г, винная кислота - 0,16 г, кальция стеарат - 0,003 г

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Острые и хронические заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся образованием трудноотделяемой мокроты повышенной вязкости (трахеобронхит, обструктивный бронхит, бронхоэктазы, пневмония и др.) - в составе комплексной терапии.

Способ применения и дозы

Внутрь по 1-2 таблетки перед едой 3 раза в сутки. Курс лечения в среднем 7-14 дней. Детям можно растворить таблетку в 1/3 стакана теплой воды.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Побочные действия

Аллергические реакции, редко - диспепсические явления.

Взаимодействие с другими препаратами

Мукалтин можно назначать одновременно с другими препаратами, применяемыми при лечении бронхолегочных заболеваний. Мукалтин не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

Условия хранения

В сухом месте, недоступном для детей, при температуре не выше 20 °С.