Инструкция по применению
Мукалтин Таблетки диспергируемые 50 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Алтея лекарственного корней экстракт
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 50 мг

Описание

Круглые, двояковыпуклые таблетки от светло-серого до коричневато-серого цвета с вкраплениями более светлого и более темного цвета, с характерным запахом смородины.

Действующее вещество

Алтея лекарственного корней экстракт

Состав

На одну таблетку: Активный компонент: алтея лекарственного травы экстракт (мукалтин) - 50,0 мг, вспомогательные вещества: кальция фосфат 2-замещенный безводный (кальция гидрофосфат безводный) - 219,03 мг, кросповидон (кросповидон CL) - 102,82 мг, винная кислота - 42,40 мг, ароматизатор черной смородины* - 5,51 мг, кальция стеарат - 4,24 мг. * В составе ароматизатора: натуральное вкусоароматическое вещество, мальтодекстрин - 62,5 %, гуммиарабик (Е 414) - 26,5 %, триацетин (Е1518) - 6,5 %.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания

Острые и хронические заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем и образованием трудноотделяемой мокроты повышенной вязкости (в т.ч. трахеобронхит, обструктивный бронхит, бронхоэктазы, пневмония) - в составе комплексной терапии.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым и детям от 12 лет по 1 -2 таблетки 2-3 раза в день перед едой. Можно растворить разовую дозу (1-2 таблетки) в 1/3 стакана тёплой воды. Курс лечения в среднем 7-14 дней. Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно по рекомендации врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, редко - диспепсические явления. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Мукалтин можно назначать одновременно с другими препаратами, применяемыми при лечении бронхолегочных заболеваний. Мукалтин не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другими противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты. Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Мукалтин проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.