Инструкция по применению
Мукалтин Фармстандарт Таблетки 50 мг 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Алтея лекарственного травы экстракт
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 50 мг
Срок годности: 2.0

Описание

круглые плоскоцилиндрические таблетки от светло-серого до коричневато-серого цвета с вкраплениями более светлого и более темного цвета, со специфическим запахом, с фаской и риской.

Действующее вещество

Алтея лекарственного травы экстракт

Состав

активный компонент: алтея лекарственного травы экстракт (мукалтин) – 50,0 мг
вспомогательные вещества: винная кислота - 43,25 мг, кальция фосфат 2-замещенный безводный (кальция гидрофосфат безводный) - 179,75 мг, кросповидон (кросповидон CL-M) - 21,0 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский, повидон К 17) - 3,0 мг, кальция стеарат - 3,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Острые и хронические заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем и образованием трудноотделяемой мокроты повышенной вязкости (трахеобронхит, обструктивный бронхит, бронхоэктазы, пневмония и др.) - в составе комплексной терапии.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям от 12 лет внутрь 1-2 таблетки 2-3 раза в день перед едой. Курс лечения в среднем 7-14 дней. Детям можно растворить таблетку в 1/3 стакана тёплой воды.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно по рекомендации врача.

Побочные действия

Аллергические реакции, редко - диспепсические явления

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Мукалтин можно назначать одновременно с другими препаратами, применяемыми при лечении бронхолегочных заболеваний. Мукалтин не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другими противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 15 ºС и относительной влажности не более 60 %. Хранить в недоступном для детей месте.