# Инструкция по применению
# Мукалтин-ЛекТ Таблетки 50 мг 30 шт

## Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Тюменский ХФЗ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Алтея лекарственного корней экстракт
Количество в упаковке: 1




## Описание

Таблетки круглой формы, плоскоцилиндрические с фаской и риской, от светло-серого до коричневато-серого цвета с вкраплениями более темных или светлых частиц.

## Действующее вещество

Алтея лекарственного корней экстракт

## Состав

Состав на одну таблетку: Действующее вещество: мукалтин (алтея лекарственного травы экстракт) экстракт сухой с содержанием суммы полисахаридов в пересчете на глюкозу 18% - 50 мг. Вспомогательные вещества: винная кислота - 160 мг, натрия гидрокарбонат - 87 мг, кальция стеарат - 3 мг.

## Форма выпуска

Таблетки

## Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата отсутствуют.

**Показания**

Острые и хронические заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с образованием трудноотделяемой мокроты повышенной вязкости (в т.ч. трахеобронхит, обструктивный бронхит, бронхоэктазы, пневмония) - в составе комплексной терапии.

**Способ применения и дозы**

У взрослых и детей старше 12 лет внутрь по 1-2 таблетки 2-3 раза в день перед едой. При применении у детей таблетку можно растворить в 1/3 стакана теплой воды. Курс лечения в среднем 7-14 дней.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, глюкозо-галактозная мальабсорбция, детский возраст до 12 лет.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно по рекомендации врача.

**Побочные действия**

Аллергические реакции, диспепсические явления.

**Передозировка**

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Мукалтин можно назначать одновременно с другими препаратами, применяемыми при лечении бронхолегочных заболеваний. Мукалтин не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

**Особые указания**

Перед тем как принимать препарат, следует посоветоваться с врачом.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте, при температуре от 8 °C до 15 °C. Хранить в недоступном для детей месте.