Инструкция по применению
Мукалтишка Сироп Вишня 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Алтея лекарственного корней экстракт
Количество в упаковке: 1



Описание

Сиропообразная от светло-желтого до желтовато-коричневого цвета жидкость с характерным запахом. Допускается наличие опалесценции.

Действующее вещество

Алтея лекарственного корней экстракт

Состав

Состав на 100 г:активный компонент: алтея корней экстракт сухой (соотношение сырья к полученному экстракту 1:3, с содержанием суммы восстанавливающих моносахаридов в пересчете на глюкозу не менее 1%) – 2,00 г,вспомогательные вещества: сахароза – 60,00 г, натрия бензоат – 0,38 г, ароматизатор Вишня* – 0,10 г, вода очищенная – до 100,00 г,* в составе ароматизатора: ароматические вещества, пропиленгликоль – 80,4%, вода – 15%.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой (трахеит, трахеобронхит, бронхит) – в составе комплексной терапии.

Способ применения и дозы

Внутрь. Лекарственная форма в виде сиропа разработана с целью обеспечения возможности применения препарата у детей любого возраста.Детям до 12 лет – по 1 чайной ложке сиропа, предварительно разведенной в 1/4 стакана теплой воды, 4-5 раз в день после еды.Детям с 12 лет и взрослым – по 1 столовой ложке сиропа, предварительно разведенной в 1/2 стакана теплой воды, 4-5 раз в день после еды. Длительность лечения составляет 10 – 15 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно после консультации с врачом.Если после лечения улучшение не наступает ши симптомы усугубляются, ши появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Гиперчувствительность к действующему веществу и/или любому вспомогательному веществу в составе препарата, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.Если у Вас есть одно из перечисленных выше заболеваний/состояний или факторов риска, перед применением препарата, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Перед применением препарата Мукалтишка, если Вы беременны или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом.В период грудного вскармливания перед применением препарата Мукалтишка необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.Если у Вас отмечаются нежелательные реакции, указанные в инструкции, ши они усугубляются, или Вы заметши любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота.Лечение: отмена препарата, промывание желудка.При появлении симптомов передозировки следует прекратить прием препарата и немедленно обратиться к врачу

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат Мукалтишка не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин, и другими противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.Если ли Вы применяете одновременно какие-либо другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Мукалтишка проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Внимательно прочитайте эту инструкцию по применению перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.• Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.• Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред, даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас. Информация для пациентов с сахарным диабетом: в I чайной ложке (5 мл) содержится 0,39 ХЕ (хлебных единиц), в 1 столовой ложке (15 мл) 1,17 ХЕ.После каждого применения горлышко флакона следует протирать влажной салфеткой, чтобы оставшийся на нем сироп не кристаллизировался. Крышку флакона нужно завинчивать плотно.Натрия бензоат, содержащийся в препарате, может усилить желтуху (пожелтение кожи и глаз) у новорожденных (до 4-х недель), увеличение билирубинемии после ее вытеснения из альбумина может усилить желтуху новорожденных, которая может перерасти в ядерную желтуху (отложения неконъюгированного билирубина в ткани мозга).Не превышать максимальные сроки и рекомендованные дозы при самостоятельном применении препарата. Если при применении препарата симптомы сохраняются без улучшения более 2 недель или ухудшаются, следует обратиться к врачу.Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмамиПрименение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Срок хранения после открытия

2 месяца

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (флакон в пачке).Хранить в недоступном для детей месте.