Инструкция по применению
Мукосат Раствор для внутримышечного и внутрисуставного введения 100 мг /мл Ампулы 1 мл 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Раствор для инъекций
Страна: Россия
Производитель: Диамед-Фарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Хондроитина сульфат
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 100 мг/мл
Срок годности: 3.0



Описание

Препарат, регулирующий обмен веществ в хрящевой ткани

Действующее вещество

Хондроитина сульфат

Состав

Хондроитина сульфат 100 мг. Вспомогательные вещества: бензиловый спирт - 9 мг, вода д/и - до 1 мл.

Форма выпуска

Раствор для инъекций

Фармакокинетика

При однократном приеме внутрь среднетерапевтической дозы С макс. в плазме достигается через 3-4 ч, в синовиальной жидкости - через 4-5 ч. Биодоступность составляет 13%. Выводится почками в течение 24 ч.

Показания

Остеопороз, парадонтопатия, переломы (для ускорения образования костной мозоли), дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника.

Способ применения и дозы

Препарат Мукосат вводят внутримышечно по 1 мл через день. При хорошей переносимости дозу увеличивают до 2 мл, начиная с четвертой инъекции. Курс лечения - 25-30 инъекций.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к хондроитина сульфату, склонность к кровоточивости, тромбофлебиты, беременность, период лактации (грудное вскармливание).

Применение при беременности и кормлении грудью

Хондроитина сульфат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Редко: аллергические реакции.

Особые указания

При различных формах парадонтопатии курс лечения следует продолжать не менее 3 месяцев. Имеются клинические данные о применении хондроитина сульфата у пожилых пациентов с атеросклерозом, при этом отмечено некоторое снижение концентрации холестерина и триглицеридов в плазме крови.

Условия хранения

Хранить в обычных условиях, в недоступном для детей месте.