Инструкция по применению
Мукосат раствор для инъекций ампулы 1 мл 5 шт

Характеристики



Форма выпуска: Ампулы
Страна: Россия
Производитель: ГИКИМП
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Хондроитина сульфат
Количество в упаковке: 5
Дозировка действующего вещества: 10%
Срок годности: 36

Действующее вещество

Хондроитина сульфат

Состав

1 мл хондроитина сульфат натрия 100 мг. Вспомогательные вещества: бензиловый спирт - 9 мг, вода д/и - до 1 мл.

Форма выпуска

Ампулы

Фармакокинетика

Хондроитина сульфат натрия легко всасывается после в/м введения. Уже через 30 мин он обнаруживается в крови в значительных концентрациях. Cmax достигается через 1 ч, затем его содержание постепенно снижается в течение 2 суток. Хондроитина сульфат натрия накапливается, главным образом, в хрящевой ткани. Синовиальная оболочка не является препятствием для его проникновения в полость сустава. Через 15 мин после в/м инъекции хондроитина сульфат натрия обнаруживается в синовиальной жидкости, затем он попадает в суставной хрящ, где его содержание достигает максимума через 48 ч.

Показания

Дегенеративные заболевания суставов и позвоночника: — остеоартроз — межпозвонковый остеохондроз.

Способ применения и дозы

Препарат Мукосат вводят в/м по 1 мл через день. При хорошей переносимости дозу увеличивают до 2 мл, начиная с 4-й инъекции. Курс лечения - 25-30 инъекций. При необходимости возможно проведение повторных курсов через 6 месяцев.

Противопоказания

— тромбофлебит — склонность к кровоточивости — повышенная чувствительность к препарату.

Применение при беременности и кормлении грудью

В настоящее время данные о применении препарата Мукосат при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) отсутствуют.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции и геморрагии в месте инъекции. В этих случаях препарат отменяют.

Взаимодействие с другими препаратами

С осторожностью следует назначать препарат Мукосат одновременно с антикоагулянтами прямого действия. Возможно так же усиление действия непрямых антикоагулянтов, антиагрегантов и фибринолитиков.

Условия хранения

В сухом месте