Инструкция по применению
Мукосат Раствор для внутримышечного и внутрисуставного введения 100 мг /мл 2 мл 5 шт

Характеристики

Форма выпуска: Раствор для инъекций
Страна: Россия
Производитель: Синтез
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Хондроитина сульфат
Количество в упаковке: 5
Дозировка действующего вещества: 100 мг/мл



Действующее вещество

Хондроитина сульфат

Состав

1 мл раствора содержит: Активное вещество: хондроитина сульфат натрия 100 мг. Вспомогательные вещества: бензиловый спирт - 9 мг, вода д/и - до 1 мл.

Форма выпуска

Раствор для инъекций

Фармакокинетика

Всасывание Хондроитина сульфат натрия легко всасывается после внутримышечного введения. Уже через 30 минут он обнаруживается в крови в значительных концентрациях: максимальная концентрация достигается через 1 час, затем его содержание в течение 2 суток постепенно снижается. Распределение Хондроитина сульфат натрия накапливается, главным образом, в хрящевой ткани. Синовиальная оболочка не является препятствием для его проникновения в полость сустава. Через 15 минут после внутримышечной инъекции хондроитина сульфат натрия обнаруживается в синовиальной жидкости, затем он попадает в суставной хрящ, где его содержание достигает максимума через 48 часов.

Показания

Мукосат назначают при лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника и суставов (при первичном артрозе, остеоартрозе с поражением крупных суставов, межпозвонковых остеоартрозах), при переломах, остеопорозах, пародонтопатиях. Мукосат эффективен в послеоперационном периоде пациентов, перенесших операции на суставах.

Способ применения и дозы

Препарат вводят внутримышечно по 1 мл через день. При хорошей переносимости дозу увеличивают до 2 мл, начиная с четвертой инъекции. Курс лечения 25-30 инъекций. При необходимости возможно проведение повторных курсов через 6 месяцев.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату; Склонность к кровоточивости; Тромбофлебиты.

Применение при беременности и кормлении грудью

В настоящее время данные о применении препарата «Мукосат» в период беременности и кормления грудью, а также у детей отсутствуют.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции и геморрагии в месте инъекции (в этих случаях препарат отменяют).

Передозировка

Данные о передозировке не предоставлены.

Взаимодействие с другими препаратами

С осторожностью следует назначать препарат Мукосат одновременно с антикоагулянтами прямого действия. Возможно так же усиление действия непрямых антикоагулянтов, антиагрегантов и фибринолитиков.