Инструкция по применению
Мукоза композитум Раствор для внутримышечного и подкожного введения гомеопатический 2,2 мл 5шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 5
Срок годности: 60

Описание

Биорегуляционный немецкий препарат. Применяется в комплексной терапии воспалительных заболеваний слизистых оболочек различной локализации, в том числе желудочно-кишечного тракта, верхних и нижних отделов дыхательных путей, мочеиспускательного канала и конъюнктивы.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на одну ампулу 2,2 мл (=2,2 г)): Активные компоненты: Mucosa nasalis suis (мукоза назалис суис) D8 22 мкл, Mucosa oris suis (мукоза орис суис) D8 22 мкл, Mucosa pulmonis suis (мукоза пульмонис суис) D8 22 мкл, Mucosa oculi suis (мукоза окули суис) D8 22 мкл, Mucosa vesicae felleae suis (мукоза везице феллэ суис) D8 22 мкл, Mucosa vesicae urinariae suis (мукоза везице уринариэ суис) D8 22 мкл, Mucosa pylori suis (мукоза пилори суис) D8 22 мкл, Mucosa duodeni suis (мукоза дуодени суис) D8 22 мкл, Mucosa oesophagi suis (мукоза эзофаги суис) D8 22 мкл, Mucosa jejuni suis (мукоза йейуни суис) D8 22 мкл, Mucosa ilei suis (мукоза илеи суис) D8 22 мкл, Mucosa coli suis (мукоза коли суис) D8 22 мкл, Mucosa recti suis (мукоза ректи суис) D8 22 мкл, Mucosa ductus choledochi suis (мукоза дуктус холедохи суис) D8 22 мкл, Ventriculus suis (вентрикулус суис) D8 22 мкл, Pankreas suis (панкреас суис) D10 22 мкл, Argentum nitricum (аргентум нитрикум) D6 22 мкл, Atropa bella-donna (Belladonna) (атропа белла-донна (белладонна)) D10 22 мкл, Oxalis acetosella (оксалис ацетоселла) D6 22 мкл, Semecarpus anacardium (Anacardium) (семекарпус анакардиум (анакардиум)) D6 22 мкл, Phosphorus (фосфорус) D8 22 мкл, Lachesis mutus (Lachesis) (ляхезис мутус (ляхезис)) D10 22 мкл, Cephaelis ipecacuanha (Ipecacuanha) (цефалис ипекакуана (ипекакуана)) D8 22 мкл, Strychnos nux-vomica (Nux vomica) (стрихнос нукс-вомика (нукс вомика)) D13 22 мкл, Veratrum album (вератрум альбум) D4 22 мкл, Pulsatilla pratensis (Pulsatilla) (пульсатилла пратенсис (пульсатилла)) D6 22 мкл, Kreosotum (креозотум) D10 22 мкл, Sulfur (сульфур) D8 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum (Natrium oxalaceticum) (натриум диэтилоксалацетикум (натриум оксалацетикум)) D8 22 мкл, Colibacillinum Nosode (Coli bacterium) (колибациллинум нозоде (коли бактериум)) D28 22 мкл, Marsdenia cundurango (Condurango) (марсдения кундуранго (кондуранго)) D6 22 мкл, Kalium bichromicum (калиум бихромикум) D8 22 мкл, Hydrastis canadensis (Hydrastis) (гидрастис канаденсис (гидрастис)) D4 22 мкл, Mandragora e radice siccata (мандрагора э радице сикката) D10 22 мкл, Momordica balsamina (момордика бальзамина) D6 22 мкл, Ceanothus americanus (цеанотус американус) D4 22 мкл, Вспомогательные вещества: вода для инъекций 1408 мг, натрия хлорид для установления изотонии.

Форма выпуска

Раствор

Показания

В комплексной терапии воспалительных заболеваний слизистых оболочек различной локализации, в том числе желудочно-кишечного тракта, верхних и нижних отделов дыхательных путей, мочеиспускательного канала и конъюнктивы.

Способ применения и дозы

При острых стадиях заболевания ежедневно по 1 ампуле, в течение первых 3 дней, затем 1-3 раза в неделю по 1 ампуле, при хронических заболеваниях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно. Курс терапии при острых стадиях заболевания 2-5 недель, при хронических заболеваниях (особенно гастриты, колиты) не менее 6 недель. Терапию проводят под наблюдением врача.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

В редких случаях возможны кожные реакции. В таком случае терапию следует прекратить и проконсультироваться у лечащего врача.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом врачу.

Условия хранения

В сухом месте