Инструкция по применению
Мульти-табс Бэби капли 30 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Дания
Производитель: Пфайзер
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины
Количество в упаковке: 1



Описание

Прозрачная жидкость от бесцветного до желтого с коричневатым оттенком цвета.

Действующее вещество

Поливитамины

Состав

В 0,5 мл содержатся: Действующие вещества: Ретинола пальмитат в 150 мкг пересчете на ретинол соответствует (витамин А) 500 МЕ Колекальциферол 5 мкг (витамин D3)* соответствует 200 МЕ Аскорбиновая кислота (витамин С) 17,5 мг В 1 мл содержатся: Действующие вещества: Ретинола пальмитат в 300 мкг пересчете на ретинол соответствует (витамин А) 1000 МЕ Колекальциферол 10 мкг (витамин D3)* соответствует- 400 МЕ Аскорбиновая кислота (витамин С) 35 мг Вспомогательные вещества: сахароза - 595,000 мг; макрогола глицерилгидроксистеарат - 25,000 мг; натрия гидрокарбонат - 16,350 мг; натрия гидроксид - 2,400 мг; лимонной кислоты моногидрат - 0,625 мг; DL - альфа-токоферол - 0,250 мг; этанол 96% - 0,063 г; натрия гидроксид - по мере надобности; хлористоводородная кислота концентрированная - по мере надобности; вода очищенная - до 1 мл. *- Колекальциферол в виде концентрата колекальциферола 1,0 млн МЕ/г - 0,448 мг: колекальциферол - 11,101 мкг, триглицериды - 0,436 мг, альфа-токоферол - 1,141 мкг.

Форма выпуска

Капли

Показания

Детям с первых дней жизни до 1 года: -профилактика недостаточности витаминов А, D3 и С; -профилактика рахита у детей

Способ применения и дозы

Детям в возрасте до 1 года – по 1 мл (25 капель) в сутки сезонными курсами 2-3 месяца. В летнее время года дозу можно уменьшить Мерная пипетка позволяет точно дозировать препарат

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата, гиперкальциемия (в связи с наличием в составе колекальциферола), непереносимость фруктозы, синдром глюкозо- галактозной мальабсорбции, дефицит сахаразы-изомальтазы. С осторожностью: При почечной недостаточности и заболеваниях сердца. Беременность и лактация: В период беременности и грудного вскармливания обычно не применяется.

Побочные действия

Возможны расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, в том числе желудочно-кишечный дискомфорт, диарея, тошнота, запор. При индивидуальной непереносимости компонентов препарата возможны аллергические реакции в виде зуда или крапивницы.

Передозировка

Симптомы передозировки - потеря аппетита, сухость слизистой оболочки полости рта, полиурия, диарея. При возникновении симптомов передозировки необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу для назначения соответствующего лечения. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении противосудорожные средства, рифампицин, неомицин снижают абсорбцию ретинола и колекальциферола. Одновременный прием витамина D с витамином А снижает риск развития передозировки последнего. Аскорбиновая кислота улучшает всасывание в кишечнике препаратов железа.

Особые указания

Во время приёма препарата не рекомендуется приём других поливитаминных препаратов во избежание передозировки. Не следует превышать рекомендованную суточную дозу. Содержание этанола во флаконе не более 7,68 об.%. Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами: О неблагоприятном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и механизмами не сообщалось.