Инструкция по применению
Мульти-табс интенсив таблетки покрытые оболочкой N30

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Дания
Производитель: Пфайзер
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 24.0



Состав

Ретинола ацетат (вит. A) 800 мкг α-токоферола ацетат (вит. E) 30 мг колекальциферол (вит. D3) 10 мкг Аскорбиновая кислота (вит. C) 200 мг тиамина мононитрат (вит. B1) 5 мг рибофлавин (вит. B2) 5 мг пантотеновая кислота (в форме кальция пантотената) 10 мг пиридоксина гидрохлорид (вит. B6) 5 мг фолиевая кислота (вит. Bc) 400 мкг цианокобаламин (вит. B12) 7 мкг никотинамид (вит. PP) 30 мг кальций (в форме карбоната) 200 мг магний (в форме оксида) 100 мг железо (в форме фумарата) 5 мг медь (в форме сульфата пентагидрата) 2 мг цинк (в форме оксида) 15 мг марганец (в форме сульфата) 2.5 мг йод (в форме калия йодида) 150 мкг селен (в форме натрия селената) 50 мкг хром (в форме хлорида) 50 мкг Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кальция гидрофосфата дигидрат, крахмал кукурузный, метилцеллюлоза, кроскармеллоза натрия, магния стеарат, желатин, кремния диоксид коллоидный, глицерол 85%, стеариновая кислота, вода, Аскорбиновая кислота. Неактивные ингредиенты, входящие в состав субстанций активных веществ: сахароза, желатин, крахмал модифицированный, крахмал кукурузный, бутилгидрокситолуол, натрия алюмосиликат, триглицериды, гипромеллоза, мальтодекстрин, натрия цитрат, лимонная кислота, вода. Состав оболочки: гипромеллоза 3, гипромеллоза 15, титана диоксид, глицерол 85%, рибофлавин, вода, тальк.

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Показания

Для детей старше 12 лет и взрослых. — профилактика гипо- и авитаминозов, а также дефицита минеральных веществ; — для повышения работоспособности при физических и интеллектуальных нагрузках; — для повышения сопротивляемости организма в комплексной терапии острых и хронических заболеваний и в период восстановления после них; — при психоэмоциональных нагрузках и стрессе; — при несбалансированном и неполноценном питании, и соблюдении диет; — в период активных тренировок у спортсменов.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет рекомендуется принимать 1 таб./сут во время приема пищи, запивая водой. При желании таблетку можно разделить пополам.

Противопоказания

— детский возраст до 12 лет; — гипервитаминоз A и D; — повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности и в период грудного вскармливания применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает риск для плода и младенца.

Побочные действия

В редких случаях возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

Передозировка

При приеме препарата в рекомендованных дозах не наблюдалась. При появлении симптомов передозировки прием препарата следует отменить, назначается симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Во время приема препарата не рекомендуется прием других поливитаминных комплексов, с целью предотвращения передозировки.

Особые указания

Во время приема препарата не рекомендуется прием других витаминных комплексов, во избежание передозировки. При приеме препарата возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что совершенно безвредно и обусловлено наличием в составе препарата рибофлавина. Не следует превышать рекомендованную суточную дозу. Возможно применение препарата у больных сахарным диабетом и лиц с непереносимостью глютена и лактозы.

Условия хранения

В сухом месте