Инструкция по применению
Бронхолитин Сироп 125 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Болгария
Производитель: Софарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Глауцин+Эфедрин+[Базилика обыкновенного масло]
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 48



Действующее вещество

Глауцин+Эфедрин+[Базилика обыкновенного масло]

Форма выпуска

Сироп

Показания

Комплексная терапия заболеваний дыхательной системы, сопровождающихся сухим кашлем: острые воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, острые и хронические бронхиты, трахеобронхиты, ХОБЛ, бронхиальная астма, пневмония, бронхоэктатическая болезнь, коклюш.

Способ применения и дозы

Для взрослых: по 2 измерительные ложки/ стаканчика (10 мл) 3-4 раза в день; для детей: 3-10 лет - по 1 измерительной ложке/ стаканчика (5 мл) 3 раза в день; для детей старше 10 лет - по 2 измерительные ложки/ стаканчика (10 мл) 3 раза в день.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность (I триместр), период грудного вскармливания, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, тяжелые органические заболевания сердца, сердечная недостаточность, феохромоцитома, тиреотоксикоз, бессонница, закрытоугольная глаукома, гипертрофия предстательной железы с клиническими симптомами, детский возраст (до 3 лет). С осторожностью - пациенты со склонностью к развитию лекарственной зависимости. Из-за содержания в составе препарата этанола следует соблюдать осторожность у пациентов с заболеваниями печени, алкоголизмом, эпилепсией, заболеваниями головного мозга, беременных и детей.

Побочные действия

Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, экстрасистолия, повышение артериального давления. Со стороны нервной системы: тремор, возбуждение, бессонница, головокружение. Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, анорексия и запор. Со стороны эндокринной системы: повышение либидо, дисменорея. Со стороны мочевыделительной системы: затруднение мочеиспускания, задержка мочи у больных с гиперплазией предстательной железы. Со стороны кожи и слизистых оболочек: сыпь, усиление потоотделения. Другие: нарушение зрения, тахифилаксия. У детей - сонливость.

Условия хранения

В сухом месте