Инструкция по применению
Папаверина гидрохлорид Таблетки 40 мг 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Папаверин
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 40 мг
Срок годности: 24.0

Описание

Спазмолитическое средство, оказывает гипотензивное действие.

Действующее вещество

Папаверин

Состав

папаверина гидрохлорид

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Биодоступность составляет 54%. Связывание с белками плазмы - 90%. Хорошо распределяется в организме, проникает через гистогематические барьеры. Метаболизируется в печени. T1/2 - 0.5-2 ч. Возможно увеличение до 24 ч.

Показания

Папаверин применяют при спазмах гладких мышц: - органов брюшной полости (холецистит, пилороспазм, спастический колит, почечная колика), - периферических сосудов (эндартериит), - сосудов головного мозга, - сосудов сердца - стенокардия (в составе комплексной терапии), - бронхоспазме. В качестве вспомогательного лекарственного средства для премедикации.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым по 40-60 мг 3-4 раза в сутки. Высшая разовая доза - 200 мг, суточная - 600 мг. Детям старше 10 лет по 20 мг 3-4 раза в сутки. Детям младше 10 лет рекомендуется прием детских форм препарата.

Противопоказания

- гиперчувствительность, - атриовентрикулярная блокада, - глаукома, - тяжелая печеночная недостаточность, - пожилой возраст (риск развития гипертермии), - детский возраст (до десяти лет). С осторожностью назначают пациентам после черепно-мозговой травмы, при хронической почечной недостаточности, недостаточности функции надпочечников, гипотиреозе, гиперплазии предстательной железы, наджелудочковой тахикардии, шоковых состояниях. При беременности и лактации безопасность препарата не установлена.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности и в период лактации (грудного вскармливания) безопасность и эффективность папаверина не установлена.

Побочные действия

Со стороны кожных покровов: аллергические реакции. Со стороны пищеварительного тракта: запор, повышение активности «печеночных» трансаминаз. Со стороны сердечно-сосудистой системы: атриовентрикулярная блокада, желудочковая экстрасистолия, снижение артериального давления. Со стороны системы кроветворения: эозинофилия. Со стороны центральной нервной системы: сонливость.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно усиление гипотензивного эффекта папаверина при совместном применении с трициклическими антидепрессантами, прокаинамидом, резерпином, хинидином. Спазмолитическое действие папаверина усиливается при одновременном применении с барбитуратами При одновременном применении папаверин снижает противопаркинсонический эффект леводопы и гипотензивный эффект метилдопы.

Особые указания

С осторожностью применять при состояниях после черепно-мозговой травмы, при хронической почечной недостаточности, при недостаточности функции надпочечников, гипотиреозе, гиперплазии предстательной железы, наджелудочковой тахикардии, шоковых состояниях. В/в следует вводить медленно и под контролем врача. В период лечения следует исключить употребление алкоголя.