Инструкция по применению
Антарейт Таблетки жевательные со вкусом мяты 800 мг 24 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки жевательные
Страна: Россия
Производитель: Валента Фарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Магалдрат
Количество в упаковке: 24
Дозировка действующего вещества: 800 мг



Описание

Двояковыпуклые таблетки белого или почти белого цвета с характерным запахом мяты, восьмиугольной формы, со скошенными краями, с гравировкой в виде буквы "А" на одной стороне. Допускается наличие незначительной мраморности.
Характеристика препарата: Препарат Антарейт® содержит действующее вещество магалдрат. Препарат Антарейт® относится к группе препаратов под названием «средства для лечения кислотозависимых заболеваний, антациды, комбинации солей и комплексные соединения алюминия, кальция и магния» и применяется для устранения или облегчения симптомов при состояниях, связанных с нарушениями кислотности в желудке. Механизм действия магалдрата основан на мгновенной регуляции кислотности желудочного сока. Препарат Антарейт® нейтрализует соляную кислоту, а также связывает пепсин и желчные кислоты (компоненты пищеварительных соков, которые могут оказывать агрессивное действие на ткани пищеварительной системы при ряде заболеваний), вследствие чего снижается раздражающее действие желудочного сока, уменьшается болевой синдром и активируются процессы восстановления поврежденной ткани. Магалдрат не оказывает влияния на моторику желудка.

Действующее вещество

Магалдрат

Состав

Препарат Антарейт содержит Действующим веществом является магалдрат. Каждая таблетка жевательная со вкусом мяты содержит магалдрат 880,00-960,00 мг (эквивалентно 800 мг магалдрата безводного). Вспомогательными веществами являются: макрогол-4000, сукралоза, ароматизатор мятный, сорбитол, натрия стеарилфумарат, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки жевательные

Показания

Препарат показан к применению у взрослых и детей от 15 лет по показаниям: Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Прием препарата Антарейт Всегда принимайте препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Рекомендуемая доза По 1-2 таблетки на один прием. Максимальная суточная доза: 6400 мг магалдрата в день (до 8 таблеток по 800 мг). Применение у детей Детям от 15 лет: по 1-2 таблетки на один прием. Максимальная суточная доза для детей от 15 лет: 6400 мг магалдрата в день (до 8 таблеток по 800 мг). Путь и (или) способ введения Внутрь, через 1 час после приема пищи и непосредственно перед сном. Таблетки тщательно разжевывают и затем запивают небольшим количеством жидкости или держат во рту до полного растворения. Продолжительность терапии Продолжайте принимать препарат до исчезновения симптомов заболевания. Длительность применения препарата без консультации врача - 2 недели. Не принимайте препарат дольше 2 недель без рекомендации лечащего врача.

Противопоказания

Не принимайте препарат Антарейт:

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. В период беременности можно принимать препарат только в течение короткого времени, чтобы избежать проникновения ионов алюминия в ткани плода. В период грудного вскармливания препарат следует принимать с осторожностью вследствие возможного выделения ионов алюминия с грудным молоком.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Антарейт может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Часто - могут возникать не более чем у 1 из 10 человек: Очень редко - могут возникать у не более чем 1 человека из 10000: Частота неизвестна - исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно: Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства - члена. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Антарейт больше, чем следовало Если Вы приняли препарата больше, чем следовало, обратитесь к лечащему врачу, возможно Вам потребуется лечение в зависимости от Вашего состояния и симптомов. Если Вы забыли принять препарат Антарейт Если Вы забыли принять препарат вовремя, пропустите эту дозу и примите следующую в запланированное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. При наличии вопросов по приему препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите своему лечащему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Препараты, которые нейтрализует кислотность желудка (антациды), к которым относится препарат Антарейт, могут снижать всасывание других лекарственных средств при совместном применении. Поэтому, интервал между приемом препарата Антарейт и других препаратов должен составлять не менее 2 часов. Сообщите врачу, если Вы принимаете любой из нижеперечисленных препаратов: Препарат Антарейт с напитками Препарат не должен приниматься вместе с напитками, обладающими кислотными свойствами (например, фруктовые соки, вино), а также вместе с шипучими таблетками, содержащими лимонную или винную кислоту, вследствие увеличения всасывания (кишечная абсорбция) ионов алюминия.

Особые указания

Перед приемом препарата Антарейт проконсультируйтесь с лечащим врачом. Обязательно сообщите врачу: Особые указания Если симптомы не исчезают в течение более 2 недель при проведении терапии препаратом, Вам необходимо обратиться к врачу для исключения наличия злокачественного заболевания. Длительное применение препарата, может вызывать снижение всасывания соединений фосфора, которые участвуют в поддержания электролитного баланса в крови (фосфатов). Препарат не содержит сахар и может применяться, если у Вас сахарный диабет. Дети Дети могут принимать препарат Антарейт только по назначению врача. Если Ваш возраст менее 18 лет, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом и соблюдайте осторожность при его применении. Препарат Антарейт содержит натрий Препарат содержит менее 1 миллимоль (23 мг) натрия, то есть по сути не содержит натрия. Препарат Антарейт содержит сорбитол Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Не изучалось, однако, учитывая механизм действия и профиль возможных нежелательных реакций, можно предположить, что препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Храните препарат в оригинальной упаковке (контурная ячейковая упаковка в пачке) при температуре не выше 25 °C.