Инструкция по применению
Нафтифин 1% Раствор для наружного применения 10 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Самарамедпром
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нафтифин
Количество в упаковке: 1



Описание

Прозрачный, бесцветный или светло-желтый раствор с запахом этанола.

Действующее вещество

Нафтифин

Состав

1 мл раствора содержит: Действующее вещество: нафтифина гидрохлорид - 10 мг. Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 50 мг, этанол 95 % - 400 мг, вода очищенная - до 1,0 мл.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

При наружном применении Нафтифин хорошо проникает в кожу, создавая устойчивые противогрибковые концентрации в различных ее слоях , что делает возможным его применение один раз в день.

Показания

Грибковые инфекции кожи и кожных складок (tinea coroporis, tinea inquinalis), в т.ч. межпальцевые микозы (tinea тапит, tinea pedum), грибковые инфекции ногтей (онихомикозы), кандидозы кожи, отрубевидный лишай, дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него). Препарат Нафифин эффективен при лечении микозов, поражающих области кожи с гиперкератозом, а также в зонах роста волос.

Способ применения и дозы

Наружно. При поражении кожи. Препарат Нафтифин наносят 1 раз в день на пораженную поверхность кожи и прилегающие к ней участки (приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения) после их тщательной очистки и высушивания. Длительность терапии при дерматомикозах - 2-4 недели (при необходимости до 8 недель), при кандидозах - 4 недели. При поражении ногтей. Препарат Нафтифин наносят 2 раза в день на пораженный ноготь. Перед первым применением препарата максимально удаляют пораженную часть ногтя ножницами или пилкой для ногтей. Длительность терапии при онихомикозах - до 6 месяцев. Для предотвращения рецидива лечение следует продолжать в течение минимум 2 недель после исчезновения клинических симптомов. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к нафтифину или другим компонентам препарата, беременность и период грудного вскармливания (безопасность и эффективность применения не установлены), противопоказано нанесение препарата на раневую поверхность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (безопасность и эффективность нафтифина у данной категории с пациентов не изучена).

Побочные действия

В отдельных случаях могут наблюдаться местные реакции: сухость кожи, гиперемия кожи (покраснение) и жжение. Побочные эффекты носят обратимый характер и не требуют отмены лечения. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При случайном проглатывании внутрь показано промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не изучалось.

Особые указания

Препарат Нафтифин не предназначен для применения в офтальмологии. Не следует допускать попадания препарата в глаза. Для достижения терапевтического эффекта требуется курсовое лечение. Пропиленгликоль, входящий в состав раствора, может вызвать раздражение кожи, при появлении побочных эффектов необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат Нафтифин не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.