Инструкция по применению
Нафтифин-Тева 1% Крем для наружного применения 15 г

Характеристики



Форма выпуска: Крем
Страна: Россия
Производитель: ТЕВА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нафтифин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%

Описание

Однородный блестящий крем белого или почти белого цвета со слабым характерным запахом.

Действующее вещество

Нафтифин

Состав

1 г крема содержит: действующее вещество: нафтифина гидрохлорид - 10,0 мг, вспомогательные вещества: изопропилмиристат - 80,0 мг, полисорбат 60 - 61,0 мг, цетиловый спирт - 40,0 мг, стеариновый спирт - 40,0 мг, цетилпальмитат - 20,0 мг, сорбитана стеарат (сорбитана моностеарат) - 19,0 мг, бензиновый спирт - 10,0 мг, натрия гидроксид - 1,2 мг, вода очищенная - до 1,0 г.

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

При наружном применении нафтифин хорошо проникает в кожу, создавая устойчивые противогрибковые концентрации в различных ее слоях. После нанесения на кожу системной абсорбции подвергается менее 6 % нафтифина. Всосавшееся количество частично подвергается метаболизму, выводится почками и через кишечник. Период полувыведения нафтифина составляет 2-3 дня.

Показания

Грибковые инфекции кожи и кожных складок (Tinea corporis, Tinea inguinalis), межпальцевые микозы (Tinea manum, Tinea pedum), грибковые инфекции ногтей (онихомикозы), кандидозы кожи, разноцветный (отрубевидный) лишай, дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него).

Способ применения и дозы

Наружно. При поражении кожи Нафтифин наносят 1 раз в день на пораженную поверхность кожи и прилегающие к ней участки (приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения) после их тщательной очистки и высушивания. Длительность терапии при дерматомикозах - 2-4 недели (при необходимости до 8 недель), при кандидозах - 4 недели. При поражении ногтей Нафтифин наносят 2 раза в день на пораженный ноготь. Перед первым применением препарата максимально удаляют пораженную часть ногтя ножницами или пилкой для ногтей. Длительность терапии при онихомикозах - до 6 месяцев. Для предотвращения рецидива лечение следует продолжить в течение минимум 2 недель после исчезновения клинических симптомов. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения или в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к нафтифину, бензиновому спирту или другим компонентам препарата, беременность и период грудного вскармливания (безопасность и эффективность применения не установлены).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение Нафтифин во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (безопасность и эффективность нафтифина у данной категории пациентов не изучена).

Побочные действия

В отдельных случаях могут наблюдаться местные реакции: сухость кожи, гиперемия кожи (покраснение) и жжение. Побочные эффекты носят обратимый характер и не требуют отмены лечения. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При случайном проглатывании внутрь показано промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не изучалось.

Особые указания

Для достижения терапевтического эффекта требуется курсовое лечение. Нафтифин не предназначен для применения в офтальмологии. Не следует допускать попадания препарата в глаза. Использование в педиатрии: С осторожностью следует применять препарат Нафтифин у детей до 18 лет (эффективность и безопасность препарата не доказана).Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Нафтифин не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.