# Инструкция по применению
# Нафтифин 1% Раствор для наружного применения 10 мл

## Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Южфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нафтифин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%




## Описание

Прозрачный, бесцветный или светло-желтый раствор с запахом этанола.

## Действующее вещество

Нафтифин

## Состав

1 мл раствора содержит: Действующее вещество: нафтифина гидрохлорид - 10 мг. Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 50 мг, этанол 95% - 400 мг. вода очищенная - 475 мг.

## Форма выпуска

Раствор

## Фармакокинетика

При наружном применении нафтифин быстро проникает в кожу, создавая устойчивые противогрибковые концентрации в различных ее слоях, что делает возможным его применение 1 раз в день.

**Показания**

Грибковые инфекции кожи и кожных складок (tinea corporis, tinea inguinalis), межпальцевые микозы (tinea manum, tinea pedum), грибковые инфекции ногтей (онихомикозы), кандидозы кожи, разноцветный (отрубевидный) лишай, дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него). Препарат эффективен при лечении микозов, поражающих области кожи с гиперкератозом, а также в зонах роста волос.

**Способ применения и дозы**

Наружно. При поражении кожи. Препарат наносят 1 раз в день на пораженную поверхность кожи и прилегающие к ней участки (приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения) после их тщательной очистки и высушивания. Длительность лечения при дерматомикозах 2-4 недели (при необходимости - до 8 недель), при кандидозах - 4 недели. При поражении ногтей. Перед первым применением препарата максимально удаляют пораженную часть ногтя ножницами или пилкой для ногтей. Препарат наносят 2 раза в день на пораженный ноготь. Длительность лечения при онихомикозах - до 6 месяцев. Для предотвращения рецидива инфекции лечение следует продолжить в течение минимум 2 недель после исчезновения клинических симптомов. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением препарата.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к нафтифину или другим компонентам препарата, беременность и период грудного вскармливания (безопасность и эффективность применения не установлены), нанесение на раневую поверхность.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (безопасность и эффективность препарата у данной категории пациентов не изучена).

**Побочные действия**

В отдельных случаях могут наблюдаться местные реакции: сухость кожи, гиперемия кожи (покраснение) и жжение. Побочные эффекты носят обратимый характер и не требуют отмены лечения. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

**Передозировка**

При применении препарата в соответствии с инструкцией по медицинскому применению передозировка маловероятна. При случайном проглатывании внутрь показано промывание желудка, симптоматическая терапия.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Не изучалось взаимодействие с другими лекарственными средствами.

**Особые указания**

Для достижения терапевтического эффекта требуется курсовое лечение. Препарат не предназначен для применения в офтальмологии. Следует избегать попадания препарата в глаза и на открытые раны. Пропиленгликоль, входящий в состав раствора, может вызывать раздражение кожи, при появлении побочных эффектов необходимо прекратить применение препарата и обраться к врачу. С осторожностью следует применять препарат у детей.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.