Инструкция по применению
Нафтизин Капли в нос 0,1 % 15 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Лекко
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нафазолин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0,1%



Описание

Нафтизин - противоконгестивное средство (альфаадреномиметик). Выпускается в форме назальных капель. Оказывает быстрое и продолжительное сосудосуживающее действие, уменьшает отечность, гиперемию. Облегчает носовое дыхание при ринитах. Через 5-7 дней использования возникает толерантность. Препарат применяется при остром рините, синусите, ларингите, отеках гортани аллергического генеза, отеках гортани на фоне облучения, гиперемии слизистой оболочки после операций на верхних дыхательных путях, а также для остановки носовых кровотечений. Имеются противопоказания (в том числе, детский возраст: для раствора 0,05% - младше 2 лет, для раствора 0,1% - младше 15 лет). Отпускается без рецепта.

Действующее вещество

Нафазолин

Состав

Действующее вещество: нафазолина нитрат - 0,5 мг или 1,0 мг. Вспомогательные вещества: борная кислота - 20,0 мг, вода очищенная - до 1 мл.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

При местном применении системная абсорбция низкая.

Показания

Острый ринит (в т. ч. на фоне острых респираторных заболеваний и аллергический ринит), синусит, евстахиит, ларингит, отек гортани аллергического генеза, отек гортани на фоне облучения, гиперемия слизистой оболочки после операций на верхних дыхательных путях. Для остановки носовых кровотечений.

Способ применения и дозы

Интраназально (в каждый носовой ход), взрослым и детям старше 15 лет назначают по 1-3 капли 0,05 % - 0,1 % раствора 3-4 раза в день. У детей старше 2 лет применяют 0,05 % раствор (или 0,025 % раствор, разбавляя 0,05 % раствор дистиллированной водой): от 2 до 6 лет - по 1-2 капли, от 6 до 15 лет - по 2 капли 1-3 раза в день. Для диагностических целей - после очистки носа в каждый носовой проход закапать по 3-4 капли или ввести тампон, смоченный в 0,05 % растворе, и оставить на 1-2 мин, при отеке голосовых связок вводить малыми дозами гортанным шприцем, при кровотечениях - ввести тампон, смоченный 0,05 % раствором. Применять кратковременно, но не более недели, не более 3-х дней у детей. Если носовое дыхание облегчается. то применение Нафтизина можно закончить раньше Повторное применение препарата возможно через несколько дней. Перед введением препарата следует тщательно очистить носовые проходы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к нафазолину или любому из вспомогательных веществ, артериальная гипертензия, выраженный атеросклероз, тиреотоксикоз, тяжелые заболевания глаз, в том числе закрытоугольная глаукома, хронический ринит, атрофический ринит, сахарный диабет, тахикардия, одновременный прием ингибиторов моноаминоксидазы и в течение 14 дней после окончания их применения, для раствора 0,05 % - детский возраст младше 2 лет, для раствора 0,1 % детский возраст младше 15 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Побочные действия

Жжение или сухость слизистой оболочки полости носа, чувство «заложенности» носа (реактивная гиперемия после прекращения воздействия препарата, набухание слизистой оболочки полости носа), тахикардия, повышение артериального давления. головная боль, раздражительность, тошнота, аллергические реакции. Длительное и частое применение нафазолина может привести к хроническому нарушению проходимости носовых ходов и атрофии слизистой оболочки носа (медикаментозный ринит).

Передозировка

При передозировке препарата в результате системного воздействия на организм могут развиться такие явления. как нервозность. повышенная потливость. головная боль. тремор, тахикардия, ощущение сердцебиения. повышение артериального давления. К возможным признакам передозировки относятся также тошнота. цианоз, дыхательные и психические расстройства. В случае угнетения центральной нервной системы наблюдается брадикардия. слабость, сонливость, снижение температуры тела, повышение потоотделения, коллапс. крайне редко возможно развитие комы. Лечение: промывание желудка, прием активированного угля (при случайном попадании препарата внутрь): симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Не следует применять одновременно с ингибиторами моноаминоксидазы или в течение 14 дней после окончания их применения. Замедляет всасывание местноанестезирующих лекарственных средств (удлиняет их действие при проведении поверхностной анестезии).

Особые указания

Может оказывать резорбтивное действие. При длительном применении выраженность сосудосуживающего действия постепенно снижается (явление тахифилаксии), в связи, с чем рекомендуется через 5-7 дней применения сделать перерыв на несколько дней. Ввиду возможного развития побочных явлений со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем не следует превышать дозы препарата Нафтизин, рекомендованные к применению. Следует избегать попадания препарата в глаза. Во избежание распространения инфекции необходимо применять препарат индивидуально.

Условия хранения

При температуре не выше 25 С, в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.