Инструкция по применению
Нафтодерил Крем для наружного применения 1 % 15 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нафтифин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%



Описание

Однородный крем белого или почти белого цвета со слабым характерным запахом.

Действующее вещество

Нафтифин

Состав

Действующее вещество: нафтифина гидрохлорид – 1,00 г. Вспомогательные вещества: цетостеариловый спирт – 8,00 г, изопропилмиристат – 8,00 г, полисорбат-60 – 6,10 г, цетилпальмитат – 2,00 г, сорбитана стеарат – 1,90 г, бензиловый спирт – 1,00 г, натрия гидроксид – 0,12 г, вода очищенная – до 100,00 г.

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

При наружном применении нафтифин хорошо проникает в кожу, создавая устойчивые противогрибковые концентрации в различных ее слоях. После нанесения на кожу системной абсорбции подвергается менее 6% нафтифина. Всосавшееся количество частично подвергается метаболизму и выводится почками и через кишечник. Период полувыведения нафтифина составляет 2-3 дня.

Показания

Грибковые инфекции кожи и кожных складок (tinea corporis, tinea inquinalis), межпальцевые микозы (tinea manum, tinea pedum), грибковые инфекции ногтей (онихомикозы), кандидозы кожи, разноцветный (отрубевидный) лишай, дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него).

Способ применения и дозы

Наружно. При поражении кожи Препарат Нафтодерил наносят 1 раз в день на пораженную поверхность кожи и прилегающие к ней участки (приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения) после их тщательной очистки и высушивания. Длительность терапии при дерматомикозах – 2-4 недели (при необходимости до 8 недель), при кандидозах – 4 недели. При поражении ногтей Препарат Нафтодерил наносят 2 раза в день на пораженный ноготь. Перед первым применением препарата максимально удаляют пораженную часть ногтя ножницами или пилкой для ногтей. Длительность терапии при онихомикозах – до 6 месяцев. Для предотвращения рецидива лечение следует продолжить в течение минимум 2 недель после исчезновения клинических симптомов. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к нафтифину, бензиловому спирту или другим компонентам препарата, беременность и период грудного вскармливания (безопасность и эффективность применения не установлены).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (безопасность и эффективность нафтифина у данной категории пациентов не изучена).

Побочные действия

В отдельных случаях могут наблюдаться местные реакции: сухость кожи, гиперемия кожи (покраснение) и жжение. Побочные эффекты носят обратимый характер и не требуют отмены лечения. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствие с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При случайном проглатывании внутрь показано промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не изучалось.

Особые указания

Препарат Нафтодерил не предназначен для применения в офтальмологии. Не следует допускать попадания препарата в глаза. Для достижения терапевтического эффекта требуется курсовое лечение. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Препарат Нафтодерил не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.