Инструкция по применению
Нафтодерил Раствор для наружного применения 1 % флакон 10 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Кировская фармацевтическая фабрика
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Нафтифин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%



Описание

Прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая жидкость, с характерным спиртовым запахом.

Действующее вещество

Нафтифин

Состав

1 мл раствора содержит: Действующее вещество: нафтифина гидрохлорид - 10 мг. Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 50 мг, этанол (спирт этиловый) 95% - 400 мг, вода очищенная - до 1,0 мл.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

При наружном применении нафтифин хорошо проникает в кожу создавая устойчивые противогрибковые концентрации в различных ее слоях что делает возможным его применение один раз в день.

Показания

- Грибковые инфекции кожи и кожных складок (tinea corporis tinea inquinalis), - межпальцевые микозы (tinea manum tinea pedum), - грибковые инфекции ногтей (онихомикозы), - кандидозы кожи, - разноцветный (отрубевидный) лишай, - дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него). Препарат Нафтодерил эффективен при лечении микозов поражающих области кожи с гиперкератозом а также в зонах роста волос.

Способ применения и дозы

Наружно. При поражении кожи Препарат Нафтодерил наносят 1 раз в день на пораженную поверхность кожи и прилегающие к ней участки (приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения) после их тщательной очистки и высушивания. Длительность терапии при дерматомикозах - 2-4 недели (при необходимости до 8 недель) при кандидозах - 4 недели. При поражении ногтей Препарат Нафтодерил наносят 2 раза в день на пораженный ноготь. Перед первым применением препарата максимально удаляют пораженную часть ногтя ножницами или пилкой для ногтей. Длительность терапии при онихомикозах - до 6 месяцев. Для предотвращения рецидива лечение следует продолжить в течение минимум 2 недель после исчезновения клинических симптомов. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются или появляются новые симптомы необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах которые указаны в инструкции. В случае необходимости пожалуйста проконсультируйтесь с врачом перед применением препарата.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к нафтифину или другим компонентам препарата, - беременность и период грудного вскармливания (безопасность и эффективность применения не установлены). - нанесение на раневую поверхность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (безопасность и эффективность нафтифина у данной категории пациентов не изучена).

Побочные действия

В отдельных случаях могут наблюдаться местные реакции: сухость кожи гиперемия кожи (покраснение) и жжение. Побочные эффекты носят обратимый характер и не требуют отмены лечения. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или отмечаются любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствие с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При случайном проглатывании внутрь показано промывание желудка симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не изучалось.

Особые указания

Препарат Нафтодерил не предназначен для применения в офтальмологии. Не следует допускать попадания препарата в глаза. Для достижения терапевтического эффекта требуется курсовое лечение. Пропиленгликоль входящий в состав раствора может вызвать раздражение кожи, при появлении побочных эффектов необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Препарат Нафтодерил не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Срок хранения после открытия

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.