Инструкция по применению
Nahrin эхинацея Сироп 250 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Швейцария
Производитель: Винокома
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0



Описание

Ежевичный сироп с эхинацеей Nahrin - БАД. Обладает целебной силой обоих растений, поэтому его можно рекомендовать не только для профилактики, но и для лечения простудных заболеваний. Сироп эхинацеи НАРИН рекомендуется принимать при остром и хроническом гастрите, язвенной болезни желудка, при хронических колитах, при мочекаменной болезни. Противораковое действие эхинацеи давно известно людям, а в последние годы антиоксидантные свойства эхинацеи и ее эффективность в борьбе с онкологическими заболеваниями получили научное подтверждение. Эхинацея повышает сопротивляемость здоровых клеток, предупреждая появление раковых, таким образом борясь с онкологическими заболеваниями. Сироп эхинацеи НАРИН также рекомендуется при нарушении обмена веществ, функции щитовидной железы и других эндокринных заболеваниях.

Состав

Сироп содержит: экстракт и концентрат сок эхинацеи, сок ежевики, лимонный сок, сахар, сироп глюкозы.

Форма выпуска

Сироп

Показания

- для предупреждения инфекционных заболеваний и активизации защитных сил организма- рекомендуется постоянно принимать во время эпидемии простудных заболеваний (грипп, ОРВИ, коклюш и др.)- применяется также против вируса герпеса повышает сопротивляемость здоровых клеток, борясь с онкологическими заболеваниями- ускоряет процесс выздоровления после оперативного вмешательства или тяжелой болезни- при аллергических заболеваниях при эндокринных заболеваниях- заболеваниях щитовидной железы- при мочекаменной болезни и других заболеваниях почек- при желудочных заболеваниях — острый или хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки- во время и после приема курса антибиотиков (профилактика дисбактериоза)- рекомендуется при кожных заболеваниях (экзема, псориаз)- способствует снятию стрессов у спортсменов

Способ применения и дозы

Принимать по 1 столовой ложке (10- 15 г) 1 раз в день или 3 раза в день по 1 чайной ложке перед едой. Эффективнее принимать курсами по 2 недели с 2-х недельным перерывом. Можно принимать в указанной дозе в течение месяца.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременным и кормящим женщинам рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении