Инструкция по применению
Найз гранулы для приготовления суспензии 100 мг 9 шт

Характеристики



Форма выпуска: Гранулы
Страна: Россия
Производитель: Др.Реддис
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Нимесулид
Количество в упаковке: 9
Дозировка действующего вещества: 100 мг

Описание

Гранулы для приготовления суспензии Найз - это нестероидный противовоспалительный препарат. Препарат предназначен для симптоматической терапии, уменьшения боли и воспаления.

Действующее вещество

Нимесулид

Состав

В 1 пакетике (2 г) содержится активного вещества нимесулида 100 мг.

Форма выпуска

Гранулы

Показания

Лечение острых болей (боль в спине, пояснице, болевой синдром в костно-мышечной системе, включая травмы, растяжения связок и вывихи суставов, тендениты, бурситы, зубная боль), симптоматическое лечение остеоартроза с болевым синдромом, альгодисменорея.

Способ применения и дозы

Гранулы принимают внутрь, по 1 пакетику (100 мг нимесулида) два раза в сутки. Препарат рекомендуется принимать после еды. Содержимое пакетика высыпают в стакан и растворяют примерно в 100 мл воды. Приготовленный раствор хранению не подлежит. Найз применяется только для лечения пациентов старше 12 лет. Подростки (в возрасте от 12 до 18 лет): на основе фармакокинетического профиля и фармакодинамических характеристик нимесулида необходимости в корректировке дозы у подростков нет.

Противопоказания

Гиперергические реакции в анамнезе, например, бронхоспазм, ринит, крапивница, связанные с приемом ацетилсалициловой кислоты или других НПВП, в т.ч. нимесулида, гепатотоксические реакции на нимесулид в анамнезе, сопутствующий (одновременный) прием лекарственных средств с потенциальной гепатотоксичностью, например, парацетамола или других анальгезирующих или нестероидных противовоспалительных препаратов, воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит) в фазе обострения, период после проведения аортокоронарного шунтирования, лихорадка при инфекционно-воспалительных заболеваниях, полное или частичное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа или околоносовых пазух с непереносимостью ацетилсалициловой кислоты и других НПВП (в т.ч. в анамнезе), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, наличие язвы в анамнезе, перфорации или кровотечения в желудочно-кишечном тракте, наличие в анамнезе цереброваскулярных кровотечений или других кровотечений, а также заболеваний, сопровождающихся кровоточивостью, тяжелые нарушения свертывания крови, тяжелая сердечная недостаточность, тяжелая почечная недостаточность (КК < 30 мл /мин), подтвержденная гиперкалиемия, печеночная недостаточность или любое активное заболевание печени, детский возраст до 12 лет, беременность и период грудного вскармливания, алкоголизм, наркозависимость, повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано в период беременности и лактации.

Особые указания

Нежелательные побочные эффекты можно свести к минимуму при использовании минимальной эффективной дозы препарата минимально возможным коротким курсом. Найз следует применять с осторожностью у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку возможно обострение этих заболеваний.