Инструкция по применению
Наксоджин таблетки 500 мг 6 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Италия
Производитель: Пфайзер
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Ниморазол
Количество в упаковке: 6
Дозировка действующего вещества: 500 мг

Действующее вещество

Ниморазол

Состав

Действующее вещество: Ниморазол (Nimorazole)Концентрация действующего вещества (мг): 500

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

В кишечнике ниморазол хорошо всасывается. При пероральном приеме ниморазола в количестве 1 г дважды в сутки в плазме создается концентрация активного компонента равная 16 мкг/мл (данный уровень препарата достигается спустя 3 часа после принятия первой дозы), 28 мкг/мл (контроль спустя 25 часов после принятия первой дозы) и 7,5 мкг/мл (контроль спустя 12 часов после того, как была принята последняя доза).

Показания

Инфекции, вызванные Trichomonas vaginalis; лямблиоз, амебиаз; вагинит, вызванный gardnerella vaginalis; острый язвенно-некротический гингивит (гингивит винсента).

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к производным нитроимидазола и вспомогательным компонентам препарата; органические поражения центральной нервной системы, в том числе эпилепсия; нарушениякроветворения с выраженной лейкопенией; тяжелая печеночная и почечная недостаточность; беременность (I триместр), лактация; детский и подростковый возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Строго запрещено применение таблеток Наксоджин во время лактации и беременности (ниморазол может оказывать мутагенное действие).

Побочные действия

Редко: сонливость, головокружение, извращение вкуса, лейкопения, сухость во рту, обложенный язык, глоссит, стоматит, диспепсия, тошнота, рвота, диарея, кожная сыпь, зуд, боль в мочеиспускательном канале, хроматурия, нарушение функции печени, парестезии, обострение психических заболеваний.

Передозировка

Передозировка ниморазола сопровождается развитием головокружения, тошноты и других проявлений со стороны пищеварительной системы. Кроме того, при передозировке возможно появление неврологической симптоматики (парестезий, онемения конечностей и судорог).Если была принята завышенная доза ниморазола, рекомендуется промыть желудок. При необходимости возможно назначение лечения для уменьшения выраженности симптомов отравления.

Взаимодействие с другими препаратами

Запрещен прием препаратов, содержащих этиловый спирт, а также употребление алкоголя во время лечения ниморазолом и в период 2-х суток после принятия последней дозы ниморазола (так как существует риск появления дисульфирамподобной реакции).Наксоджин потенцирует антикоагулянтный эффект варфарина.При сочетанном применении с ниморазолом снижается клиренс препаратов лития и фенитоина.При сочетанном применении с фенобарбиталом сывороточный уровень ниморазола может уменьшаться.Циметидин при одновременном приеме увеличивает плазменные концентрации ниморазола.