Инструкция по применению
Наринэ Порошок флаконы 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Жидкость
Страна: Россия
Производитель: Фермент
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 10



Описание

Биологически активная добавка к пище «Наринэ» биомасса ацидофильных лактобактерий представляет собой лиофилизат живых бактерий Lactobacillus acidophilus EP 317/402 (авторское свидетельство СССР № 163573 от 27.04.1964 г.). БАД «Наринэ» биомассы ацидофильных лактобактерий (БАЛБ) во флаконах имеет вид порошкообразной или кристаллической массы от светло-бежевого до кремового цвета различной интенсивности, допускается « мраморность» окраски. После растворения водой образует непрозрачную гомогенную смесь от светло-бежевого до кремового цвета. Применяется как самостоятельно перорально, так и в качестве заквасочной культуры, которую используют для получения кисломолочного лечебного продукта « Наринэ» для детского и диетического питания. В растворенном виде БАД «Наринэ» БАЛБ используют также и для наружного применения. БАД «Наринэ» БАЛБ разрешен к применению Государственным комите том санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации, рекомендован Институтом питания РАМН, одобрен Всемирной Организацией Здравоохранения. Биологические и иммунобиологические свойства: Молочнокислые бактерии - естественные обитатели кишечника, играющие важнейшую роль в нормализации жизнедеятельности человека. Они вырабатывают и выделяют ряд жизненно важных аминокислот, ферментов, способствующих перевариванию белков, жиров, углеводов, синтезируют витамины группы В, С, фолиевую кислоту и др. Лактобактерии, содержащиеся в БАД «Наринэ» БАЛБ хорошо приживаются в кишечнике и устойчивы к действию многих антибиотиков и химиотерапевтических препаратов. Они обладают выраженной антагонистической активностью в отношении широкого круга патогенных и условно-патогенных микроорганизмов (возбудителей дизентерии, брюшного тифа, сальмонеллеза, патогенных кишечных палочек, стрептококков, стафилококков, протея и др.), вытесняя их из кишечника и способствуя тем самым восстановлению его нарушенной микрофлоры, улучшают усвоение железа, кальция, других микроэлементов, нормализуют уровень гемоглобина и обменные процессы в организме, повышают устойчивость организма к инфекционным, токсическим и другим агентам, обладают радиопротекторным и адаптогенным эффектом.

Состав

Одна капсула 180 мг содержит: Лиофилизат молочнокислых бактерий Lactobacillus acidophilus штамм n.v. Ep 317/402 (NARINE) -100 мг. Наполнители: крахмал кукурузный - 80 мг, капсулы желатиновые 40-45 мг. Содержание пробиотических лактобактерий в суточной порции - 7,2 х 10' КОЕ.

Форма выпуска

Жидкость

Показания

БАД «Наринэ» БАЛБ высокоэффективен при: дисбактериозе, дисфункциях кишечника, энтероколитах, кишечных инфекциях (дизентерия, сальмонеллез, стафилококковая инфекция и др.), особенно у детей и ослабленных больных. Эффективен в комплексном лечении: аллергических поражений кожи и слизистых (диатез, нейродермиты, псориаз, экземы), воспалительных заболеваний органов дыхания (бронхиальная астма, бронхиты, пневмония), гинекологических заболеваний, ЛОР-органов (тонзиллит), маститов, пародонтоза, сахарного диабета, гнойно-восполительных и других заболеваний. БАД «Наринэ» БАЛБ в качестве заквасочной культуры для получения кисломолочного лечебного продукта «Наринэ» целесообразно применять детям с первых дней жизни , в том числе и недоношенным, в следующих случаях: при отсутствии материнского молока - в качестве его заменителя или прикорма; при аллергических заболеваниях (диатез, бронхиальная астма, различные поражения кожи и слизистых). В ряде случаев во время лечения, особенно и грудных детей, в первые двое суток может быть учащенный стул с обильным выделением слизи. При этом следует увеличить количество потребляемого продукта, и через 2 суток стул нормализируется. Детям старшего возраста и взрослым кисломолочный лечебный продукт «Наринэ» показан при: длительных кишечных дисфункциях инфекционной и неустановленной этиологии; лечении последствий лучевых поражений, отравлении тяжелыми металлами и промышленными ядами; длительном применении антибиотиков, гормонов и лучевой терапии; язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и после операций на этих органах с синдромом нарушения всасывания. БАД «Наринэ»БАЛБ применяют наружно для лечения: местных поражений кожных покровов и слизистых оболочек (ожоги, нагноения ран после травм или операций, заболевания слизистой носоглотки, полости рта, вагины, кольпиты, маститы и пр.), при обработке сосков молочных желез матерей перед кормлением ребенка. БАД «Наринэ» БАЛБ перорально применяют для лечения больных, начиная с 3-летнего возраста. БАД «Наринэ» БАЛБ и кисломолочный лечебный продукт «Наринэ» может сочетаться с лекарственными средствами и различными пищевыми продуктами.

Способ применения и дозы

Применение БАД «Наринэ» БАЛБ в качестве кисломолочного лечебного продукта «Наринэ» для детского питания продукт готовят ежедневно. Перед употреблением, при желании, добавляют фруктовые сиропы или соки, рисовый или пшеничный отвары. Количество продукта и частота кормления детей разного возраста аналогичны схеме искусственного кормления детей при отсутствии материнского молока; для лечебно-профилактических целей - в качестве лечебного средства продукт, как правило, следует принимать по 1/2-3/4 стакана 3 раза в день за 30-40 минут до приема пищи в течение 15-30 дней. Для профилактики рецидивов перенесенных заболеваний можно применять длительное время как кисломолочный лечебный продукт, так и смесях его с другими кисломолочными продуктами, с добавлением сиропов, варенья, меда, отваров, фруктовых и овощных соков. Применение БАД «НАРИНЭ» БАЛБ в виде раствора (взвеси): для наружного применения, полосканий и спринцеваний в лечебно-профилактических целях; перорально. Флакон с препаратом заливают до горлышка теплой (38±2)°С кипяченой водой и взбалтывают до получения гомогенной взвеси. Стерильный ватный тампон на палочке погружают во флакон и смачивают микробной взвесью поверхность ожогов, ран или язв. Смазывают тампоном или полоскают горло, полость при ангинах, фарингитах, пародонтозах, гингивитах 4-6 раз в течение 5-7 дней. При гинекологических заболеваниях применяют пропитанный взвесью тампон или проводят спринцевания раствором. Перед кормлением ребенка грудью смачивают соски тампоном с микробной взвесью. Эту же процедуру повторяют после кормления. В случае образования трещин на сосках на них накладывают смоченные взвесью стерильные салфетки и оставляют до следующего кормления. При пероральном применении растворенный БАД « Наринэ» применяют: детям старше 1 года — по 1 флакону 2 раза в день, детям старше 12 лет и взрослым — по 2-3 флакона 2 раза в день. Детям от 1 года до 12 лет принимать БАД по согласованию с врачом-педиатром. Продолжительность приема — 30 дней. Лицам с повышенной кислотностью желудочного сока рекомендуется за 5-10 минут до приема препарата выпить полстакана минеральной воды - «Боржоми», «Ессентуки» №4, 17 или раствор питьевой соды (1/4 чайной ложки на полстакана воды).

Противопоказания

Противопоказаний не выявлено. Побочных реакций на применение БАД « Наринэ» БАЛБ не отмечено.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Срок хранения после открытия

Срок хранения рабочей закваски - не более 7 суток при 2-10°C. Срок хранения кисломолочного лечебного продукта - не более 2 суток при 2-10°C .

Условия хранения

При температуре от 2 до 8°C.