Инструкция по применению
Наринэ Капсулы 180 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Армения
Производитель: Нарэкс
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60
Срок годности: 24

Описание

Препарат представляет собой твёрдо-желатиновые капсулы №3, наполненные порошком бело-кремового цвета. Активное вещество — лиофилизированная (высушенная) культура молочнокислых бактерий Lactobacillus s.p. штамм n.v. Ep 317 /402 (Narine). Этот штамм был выделен армянским учёным Л.А. Ерзинкяном в 1964 году и по своим свойствам отличается от других ацидофильных бактерий. СвойстваВысокая приживаемость в ЖКТ. Штамм эффективно колонизирует кишечник. Устойчивость. Бактерии сохраняют жизнеспособность и активность даже при приёме антибиотиков, химиотерапевтических и антисептических препаратов, что позволяет применять «Наринэ» одновременно с ними.Витаминообразующая способность. Штамм способен синтезировать витамины в организме.Иммуномодулирующее действие. Стимулирует выработку интерферона, повышая защитные силы организма. Нормализация микрофлоры. Быстро восстанавливает баланс анаэробных бактерий (лактобактерий и бифидобактерий), повышает активность нормальной кишечной палочки.Ферментативная активность. Выделяет ферменты, которые улучшают переваривание белков, жиров и углеводов, а также усвоение микроэлементов. Антимикробное действие. Подавляет рост патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.

Состав

Активное вещество:1 капсула содержит: лиофилизированная культура Lactobacilus acidophilus и компоненты среды; содержание молочнокислых микроорганизмов не менее 10*9 КОЕ/г.Вспомогательные вещества:Крахмал кукурузный, желатин

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Рекомендуется в качестве БАД — источника пробиотических микроорганизмов при: Дисбактериозе кишечника (профилактика и лечение).Дисфункции кишечника после приёма антибиотиков, гормонов, химио- или лучевой терапии.Энтероколитах, дизентерии, сальмонеллёзе, стафилококковой инфекции (в комплексной терапии). Атопическом дерматите, экземе, нейродермите (в комплексном лечении).Сахарном диабете, пародонтозе, некоторых гинекологических заболеваниях (в комплексном лечении).Коррекции микрофлоры у лиц, подвергшихся воздействию малых доз ионизирующей радиации.В качестве общеукрепляющего средства для взрослых на предприятиях с вредными условиями труда.

Способ применения и дозы

Детям старше 5 лет и взрослым: по 4 капсулы в день за 15–20 минут до еды.Детям от 1 года до 14 лет: принимать только по согласованию с врачом-педиатром. Продолжительность приёма: 14–20 дней (зависит от причины дисбактериоза и индивидуальных особенностей).

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности и грудном вскармливании приём возможен после согласования с врачом.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °C.