Инструкция по применению
Наропин раствор для инъекций 2мг/мл 20мл ампулы N5

Характеристики

Форма выпуска: Ампулы
Страна: Швеция
Производитель: Аспен Фарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Ропивакаин
Количество в упаковке: 5
Дозировка действующего вещества: 2 мг/мл



Действующее вещество

Ропивакаин

Состав

1 мл 1 амп. ропивакаина гидрохлорид 2 мг 40 мг. Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид - 100 мкг, динатрия эдетата дигидрат - 1 мг, натрия хлорид - 1.8 мг, борная кислота - 12 мг, натрия тетрабората декагидрат - 570 мкг, вода д/и - до 1 мл.

Форма выпуска

Ампулы

Показания

Анестезия при хирургических вмешательствах: эпидуральная блокада при хирургических вмешательствах, включая кесарево сечение . блокада крупных нервов и нервных сплетений . блокада отдельных нервов и местная инфильтрационная анестезия. Купирование острого болевого синдрома: длительная эпидуральная инфузия или периодическое болюсное введение, например, для устранения послеоперационной боли или обезболивания родов . блокада отдельных нервов и местная инфильтрационная анестезия.

Способ применения и дозы

Дозу устанавливают индивидуально в зависимости от показаний, клинической ситуации, состояния пациента.

Противопоказания

Детский возраст до 12 лет, повышенная чувствительность к местным анестетикам амидного типа.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности возможно в случаях, когда потенциальная польза терапии матери превышает существующий риск для плода. Имеются данные об отсутствии отрицательных эффектов при применении ропивакаина в акушерстве для анестезии или анальгезии. Ропивакаин хорошо проникает через плацентарный барьер. Связывание с белками плазмы крови у плода ниже, чем у матери. При необходимости применения в период лактации следует учитывать, что ропивакаин в небольшом количестве выделяется с грудным молоком.

Побочные действия

Аллергические реакции: кожные проявления, анафилактический шок. Большинство побочных эффектов, возникающих при анестезии, связаны не с воздействием используемого анестетика, а с техникой проведения регионарной анестезии. Наиболее часто (более 1%) отмечались следующие неблагоприятные эффекты, которые были расценены как имеющие клиническое значение вне зависимости от того, была ли установлена причинно-следственная связь с применением анестетика. Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, артериальная гипотензия, брадикардия, тахикардия. Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота. Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: головная боль, головокружение, парестезии. Невропатия и нарушения функции спинного мозга (синдром передней спинальной артерии, арахноидит) обычно связаны с техникой проведения регионарной анестезии, а не с действием ропивакаина. Прочие: повышение температуры тела, озноб, задержка мочеиспускания.

Особые указания

Аллергические реакции: кожные проявления, анафилактический шок. Большинство побочных эффектов, возникающих при анестезии, связаны не с воздействием используемого анестетика, а с техникой проведения регионарной анестезии. Наиболее часто (более 1%) отмечались следующие неблагоприятные эффекты, которые были расценены как имеющие клиническое значение вне зависимости от того, была ли установлена причинно-следственная связь с применением анестетика. Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, артериальная гипотензия, брадикардия, тахикардия. Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота. Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: головная боль, головокружение, парестезии. Невропатия и нарушения функции спинного мозга (синдром передней спинальной артерии, арахноидит) обычно связаны с техникой проведения регионарной анестезии, а не с действием ропивакаина. Прочие: повышение температуры тела, озноб, задержка мочеиспускания.