Инструкция по применению
Натальсид Суппозитории ректальные 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Натрия альгинат
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 250 мг
Срок годности: 36.0



Описание

Суппозитории светло-серого цвета с кремоватым оттенком, торпедообразной формы.

Действующее вещество

Натрия альгинат

Состав

Один суппозиторий содержит: действующее вещество - натрия альгинат (натрия альгинат) - 250 мг, вспомогательные вещества: жир твердый (Витепсол (марки H 15, W 35), Суппосир (марка NA 15, NAS 50)).

Форма выпуска

Суппозитории

Показания

Хронические анальные трещины в стадии эпителизации, хронический кровоточащий геморрой, проктосигмоидит и воспалительные явления в прямой кишке в послеоперационном периоде.

Способ применения и дозы

Ректально. Перед применением суппозиторий освобождают от контурной упаковки. Суппозиторий вводят в прямую кишку после самопроизвольного опорожнения кишечника или очистительной клизмы. Взрослым и детям старше 14 лет - по 1 суппозиторию 2 раза в сутки. Длительность курса лечения препаратом Натальсид- составляет 7-14 дней.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 14 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Препарат Натальсид не противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки неизвестны. При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимых лекарственных взаимодействий отмечено не было.

Особые указания

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами, работе с механизмами.

Срок хранения после открытия

3 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении