**Инструкция по применению**
**Натамицин Суппозитории вагинальные 100 мг 3 шт**

### Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Авва Рус
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Натамицин
Количество в упаковке: 3
Дозировка действующего вещества: 100 мг




### Описание

Суппозитории торпедовидной формы от светло-желтого до светло-коричневого цвета. На продольном разрезе должны отсутствовать посторонние включения. Допускается наличие воздушног о стержня или воронкообразного углубления.

### Действующее вещество

Натамицин

### Состав

Состав на один суппозиторий: Действующее вещество: натамицин (в пересчете на 100% вещество) - 100,0 мг, Вспомогательные вещества: макрогола глнцерилгидроксистеарат - 75,0 мг, кремния диоксид коллоидный - 20,0 мг, жир твердый (Суппоцир АМ) до получения суппозитория массой 1500,0 мг.

### Форма выпуска

Суппозитории

### Фармакокинетика

Натамицин не оказывает системного действия, так как практически не всасывается через неповрежденную кожу и интактные слизистые оболочки.

**Показания**

Вагиниты, вульвиты, вульвовагнпиты, вызванные грибами рода Candida.

**Способ применения и дозы**

Способ введения - для вагинального применения Суппозитории, предварительно освободив от контурной упаковки, вводят во влагалище, находясь в положении лежа, как можно глубже 1 раз в сутки на ночь. Дозирование При кандидозных вагинитах, вульвитах, вульвовагинитах: интравагинально по одному суппозиторию в течение 3-6 дней. Продолжительность курса лечения устанавливают индивидуально. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжать лечение еще несколько дней. Во время менструации применение суппозиториев прерывают. При упорном течении вагинитов, вызванных Candida albicans, дополнительно назначают Натамицин в виде таблеток для приема внутрь: по 1 таблетке 4 раза в день в течение 10-20 дней для санации очага кандидозной инфекции в кишечнике.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Возможно применение препарата у беременных и в период лактации.

**Побочные действия**

При местном применении возможно легкое раздражение и ощущение жжения в месте введения.

**Передозировка**

В настоящее время о случаях передозировки препарата не сообщалось.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Лекарственное взаимодействие препарата Натамицин с другими лекарственными препаратами не описано.

**Особые указания**

При вагинальной аппликации пои действием температуры тела суппозитории превращаются в пенистую массу, что способствует равномерному распределению натампцина но слизистой оболочке влагалища. В период лечения нет необходимости в исключении половых контактов, однако рекомендуется провести обследование половых партнеров и. в случае выявления кандидозного поражения, провести курс лечения натамицином. В период лечения следует использовать барьерные методы контрацепции.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата Натамицин нс влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

**Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.