Инструкция по применению
Натамицин Суппозитории вагинальные 100 мг 5 шт

Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Южфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Натамицин
Количество в упаковке: 5
Дозировка действующего вещества: 100 мг



Описание

Суппозитории торпедовидной формы от светло-желтого до светло-коричневого цвета. На продольном разрезе должны отсутствовать посторонние включения. Допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

Действующее вещество

Натамицин

Состав

1 суппозиторий содержит:Действующее веществоо: натамицин - 100 мг.
Вспомогательные вещества: макроголглицерола гидроксистеарат 40 - 65 мг, кремния диоксид коллоидный - 20 мг, жир твердый - до 2.44 г.

Форма выпуска

Суппозитории

Фармакокинетика

Натамицин не оказывает системного действия, так как практически не всасывается через неповрежденную кожу и интактные слизистые оболочки.

Показания

Вагиниты, вульвиты, вульвовагнпиты, вызванные грибами рода Candida.

Способ применения и дозы

Способ введения - для вагинального применения Суппозитории, предварительно освободив от контурной упаковки, вводят во влагалище, находясь в положении лежа, как можно глубже 1 раз в сутки на ночь.Дозирование При кандидозных вагинитах, вульвитах, вульвовагинитах: интравагинально по одному суппозиторию в течение 3-6 дней.Продолжительность курса лечения устанавливают индивидуально. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжать лечение еще несколько дней. Во время менструации применение суппозиториев прерывают.При упорном течении вагинитов, вызванных Candida albicans, дополнительно назначают натамицин в виде таблеток для приема внутрь: по 1 таблетке 4 раза в день в течение 10-20 дней для санации очага кандидозной инфекции в кишечнике.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение препарата у беременных и в период лактации.

Побочные действия

При местном применении возможно легкое раздражение и ощущение жжения в месте введения.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Натамицин с другими лекарственными препаратами не описано.

Особые указания

При вагинальной аппликации пои действием температуры тела суппозитории превращаются в пенистую массу, что способствует равномерному распределению натампцина но слизистой оболочке влагалища.В период лечения нет необходимости в исключении половых контактов, однако рекомендуется провести обследование половых партнеров и. в случае выявления кандидозного поражения, провести курс лечения натамицином. В период лечения следует использовать барьерные методы контрацепции.Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами:Применение препарата Натамицин нс влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Условия хранения

В защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25 °С Хранить в недоступном для детей месте.