Инструкция по применению
НАТРОЛ ВИТАМИН D3 МЕ 2000 РАСТВ. ТАБЛ.№90

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Фармацевтическая компания ОМ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 90
Срок годности: 3.0



Описание

Холекальциферол - это форма витамина D, которую следует принимать дополнительно при недостатке питания и солнечного света. Исследования показали, что витамин D способствует росту здоровых клеток, поддерживает иммунитет, здоровье сердца и продлевает молодость. Витамин D3 Fast Dissolve от Natrol со вкусом клубники можно принимать в любое время, в любом месте. Не нужно воды. Таблетки быстро растворяются.

Состав

Лимонная кислота, стеариновая кислота, яблочная кислота, мальтодекстрин, витамин d3, ксилит, магния стеарат, свеклы корня экстракт, целлюлозная камедь.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

профилактика и лечение рахита профилактика дефицита витамина D3 у групп высокого риска (мальабсорбция, хронические заболевания тонкой кишки, билиарный цирроз печени, состояние после резекции желудка и/или тонкой кишки) поддерживающая терапия остеопороза (различного генеза) лечение остеомаляции (на фоне нарушений минерального обмена у пациентов старше 45 лет, длительной иммобилизации в случае травм, соблюдения лист с отказом от приема молока и молочных продуктов) лечение гипопаратиреоза и псевдогипопаратиреоза

Способ применения и дозы

Согласно инструкции, если другого не рекомендовал врач.

Противопоказания

гиперкальциемия гипервитаминоз D3 почечная остеодистрофия с гиперфосфатемией кальциевый нефроуролитиаз повышенная чувствительность (в т.ч. при тиреотоксикозе)

Применение при беременности и кормлении грудью

Хроническая передозировка (гиперкальциемия, проникновение мстаболитов витамина D3 через плаценту), возникающая при беременности в случае длительного приема препарата в высоких дозах, может вызвать дефекты физического и умственною развития плода, особые формы аортального стеноза. Витамин D3 и его метаболиты выделяются с грудным молоком.

Побочные действия

Аллергические реакции, гиперкальциемия, гиперкальциурия, снижение аппетита, полиурия, запор, метеоризм, тошнота, абдоминальная боль, головная боль, миалгия, артралгия, повышение АД, аритмия, нарушение функции почек, обострение туберкулезного процесса в легких.

Особые указания

Для профилактики гиповитаминоза D3 наиболее предпочтительно сбалансированное питание. Новорожденные, находящиеся па грудном вскармливании, особенно рожденные матерями с темной кожей и/или получавшие недостаточную инсоляцию, имеют высокий риск возникновения дефицита витамина D3. В пожилом возрасте потребность в витамине D3 может возрастать вследствие уменьшения абсорбции витамина D3, снижения способности кожи синтезировать провитамин D3. уменьшения времени инсоляции, возрастания частоты возникновения почечной недостаточности. Так как при псевдогипопаратиреозе могут существовать фазы нормальной чувствительности к витамину D3, необходимо проводить коррекцию дозы препарата. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Данные о возможном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и механизмами отсутствуют.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей, при комнатной температуре.