Инструкция по применению
Назол Адванс Спрей назальный 10 мл

Характеристики

Форма выпуска: Спрей
Страна: Италия
Производитель: Байер
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Оксиметазолин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.025 мг/доза
Срок годности: 36.0



Описание

Противоконгестивное средство – вазоконстриктор (альфа 2-адреномиметик) .

Действующее вещество

Оксиметазолин

Состав

100 мл содержат: действующее вещество: оксиметазолина гидрохлорид 0,05 г вспомогательные вещества: бензалкония хлорид 0,02 г; камфора рацемическая 0,17 г; эвкалиптол (цинеол) 0,17 г; левоментол 0,17 г; динатрия эдетат дигидрат 0,1 г; полисорбат 80 0,2 г; пропиленгликоль 10 г; натрия гидрофосфат дигидрат 0,006 г; натрия дигидрофосфат дигидрат 0,65 г; кислота хлористоводородная конц. 0,003 г; вода очищенная 89,711 г. доза содержит: действующее вещество: оксиметазолина гидрохлорид 0,025 мг; вспомогательные вещества: бензалкония хлорид 0,01 мг; камфора рацемическая 0,085 мг; эвкалиптол (цинеол) 0,085 мг; левоментол 0,085 мг; динатрия эдетат дигидрат 0,05 мг; полисорбат 80 0,1 мг; пропиленгликоль 5 мг; натрия гидрофосфат дигидрат 0,003 мг; натрия дигидрофосфат дигидрат 0,325 мг; кислота хлористоводородная конц. 0,0015 мг; вода очищенная 44,8555 мг.

Форма выпуска

Спрей

Показания

Для облегчения носового дыхания при «простудных» заболеваниях и вирусных инфекциях верхних дыхательных путей, синусите, рините любой этиологии.

Способ применения и дозы

Интраназально. 1 доза содержит 0,025 мг оксиметазолина гидрохлорида. Взрослым и детям старше 12 лет – по 2-3 дозы в каждый носовой ход 2 раза в день. Детям от 6 до 12 лет – по 1 дозе в каждый носовой ход 2 раза в день. Не следует применять препарат чаще 2 раз в день. Продолжительность лечения: Не рекомендуется применять препарат более 3 дней. При частом или длительном применении препарата чувство затруднения носового дыхания может появиться вновь или ухудшиться. При появлении этих симптомов следует прекратить лечение и обратиться к врачу. При впрыскивании не запрокидывать голову назад и не распылять в положении «лежа».

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату или его компонентам, атрофический ринит, закрытоугольная глаукома, выраженный атеросклероз, состояния после транссфеноидальной гипофизэктомии, одновременное применение ингибиторов моноаминооксидазы (включая период 14 дней после их отмены), детский возраст до 6 лет, беременность, период лактации.

Побочные действия

Жжение или сухость слизистой оболочки полости носа, сухость в полости рта и горле, чихание, увеличение объема секрета, выделяющегося из полости носа. После того, как пройдет эффект от применения препарата, сильное чувство «заложенности» носа (реактивная гиперемия). Побочные эффекты, обусловленные системным действием препарата: повышение артериального давления, головная боль, головокружение, ощущение сердцебиения, тревога, тошнота, бессонница. Бензалкония хлорид, входящий в состав препарата, может вызвать раздражение слизистой оболочки полости носа. При длительном применении препарата (более 7 дней) возможны: реактивная гиперемия слизистой оболочки полости носа, атрофия слизистой оболочки полости носа, тахифилаксия (быстрое снижение лечебного эффекта при повторном применении).

Передозировка

При передозировке или случайном приеме препарата внутрь возможно развитие следующих симптомов: тошнота, рвота, цианоз, лихорадка, тахикардия, аритмия, повышение артериального давления, одышка, психические расстройства, угнетение центральной нервной системы (сонливость, снижение температуры тела, брадикардия, снижение артериального давления, остановка дыхания и кома). Лечение – симптоматическое, при случайном приеме внутрь – промывание желудка, прием активированного угля.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с ингибиторами МАО и трициклическими антидепрессантами может наблюдаться повышение артериального давления. Препарат замедляет всасывание местноанестезирующих препаратов, удлиняет их действие. Совместное назначение других сосудосуживающих препаратов повышает риск развития побочных эффектов.

Особые указания

В рекомендованной дозировке без консультации с врачом использовать не более 3 дней. Избегать попадания препарата в глаза. Препарат оказывает влияние на зрение, возможно снижение скорости реакции. Во избежание распространения инфекции необходимо использовать препарат индивидуально. При продолжительном применении (более одной недели) возможно возобновление симптомов заложенности носа.

Условия хранения

При комнатной температуре