Инструкция по применению
Нейрвана Раствор 350 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Витаукт-Пром
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Оказывает благоприятное действие на функциональное состояние центральной и вегетативной нервной системы, обладает антидепрессивной и анксиолитической активностью. Восстанавливает биоритмы при смене часовых поясов. Оказывает успокаивающее действие, не вызывая сонливости. Восстанавливает здоровый и глубокий сон: ускоряет засыпание, уменьшает число ночных пробуждений, улучшает самочувствие после утреннего пробуждения. Повышает устойчивость к стрессам. Устраняет чувство тревоги.

Состав

На 5 мл (6. 0 г) - 1 чайная ложка: Активные компоненты:таурин 1,962 г,глицин 0,171 г, янтарная кислота 0,081, полиэкстракт (2:1) 1,500 г. массовая доля компонентов полиэкстракта: зверобоя продырявленного трава 0,750 г, мелиссы лекарственной листья 0,375 г, липы сердцевидной цветки 0,150 г,хмеля обыкновенного соплодия 0,150 г,персика обыкновенного листья 0,075 г. Вспомогательные компоненты:сорбит не более 3,00. Соотношение 2:1 соответствует соотношению растительное сырье: полиэкстракт (из 2 частей растительного сырья получают 1 часть экстракта). В качестве экстрагента используются вода и этанол различной концентрации для оптимального извлечения широкого спектра необходимых биологически активных веществ. Сорбат калия не более 0,01 г, Лимонная кислота 0,005 г, Вода очищенная q. s.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Психовегетативные, невротические расстройства. Повышенная нервная возбудимость. Расстройства сна (бессонница, частые пробуждения). В качестве адаптогена для нормализации биологических ритмов. Состояния беспокойства, тревоги, страха. Депрессивные состояния легкой и средней степени тяжести. Сезонные аффективные расстройства. Эмоциональная неуравновешенность и склонность к тоске. Повышенная раздражительность, утомляемость. Хронический алкоголизм, абстинентный синдром, профилактика обострений при хроническом алкоголизме, никотиновой зависимости. Психоэмоциональные расстройства, связанные с климаксом.

Способ применения и дозы

Принимать внутрь, за 20-30 минут до еды или через 30-40 минут после еды. Можно разбавить или запить водой. По 5-10 мл (1-2 мерные ложки) 2-3 раза в день. Курс приема 20-30 дней. Повторные курсы через 3-6 месяцев.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью, склонность к расстройствам функции кишечника, одновременный прием с ингибиторами МАО.

Срок хранения после открытия

Вскрытый флакон хранить в холодильнике не более месяца.