Инструкция по применению
Некст Уно Экспресс Капсулы 200 мг 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Беларусь
Производитель: Отисифарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ибупрофен
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 200 мг

Описание

Капсулы Некст Уно Экспресс - капсулы мягкие желатиновые овальной формы, со швом, прозрачные, красного цвета. Содержимое капсул - бесцветная или с розовым оттенком прозрачная жидкость.

Действующее вещество

Ибупрофен

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Применяют при головной боли, мигрени, зубной боли, болезненных менструациях, невралгии, боли в спине, мышечных и ревматических болях. при лихорадочных состояниях при гриппе и простудных заболеваниях. Предназначен для симптоматической терапии, уменьшения боли и воспаления на момент пользования, на прогрессирование заболевания не влияет.

Способ применения и дозы

Некст® Уно Экспресс назначают взрослым и детям старше 12 лет внутрь после еды, по 200 мг (1 капсуле) 3-4 раза в сутки. Капсулы следует запивать стаканом воды. Для достижения быстрого терапевтического эффекта доза может быть увеличена до 400 мг (2 капсулы) 3 раза в сутки. При достижении лечебного эффекта суточную дозу препарата уменьшают до 600-800 мг. Максимальная суточная доза для взрослых составляет 1200 мг (не принимать более 6 капсул за 24 часа). Максимальная суточная доза для детей 12-18 лет составляет 800 мг. Повторную дозу принимать не ранее чем через 4 часа.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к ибупрофену и другим компонентам препарата. - эрозивно-язвенные заболевания желудочно-кишечного тракта (в т. ч. язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, язвенный колит, пептическая язва, болезнь Крона). - полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или др. НПВП (в т. ч. в анамнезе). - нарушения свертывания крови (в т. ч. гемофилия, удлинение времени кровотечения, склонность к кровотечениям, геморрагический диатез). - детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

В исследованиях на животных не обнаружено неблагоприятного влияния ибупрофена на плод. Ввиду отсутствия достаточного количества хорошо контролируемых наблюдений на людях препарат следует применять в первом и втором триместрах беременности только в случаях острой необходимости, если потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

При применении препарата Некст® Уно Экспресс в течение 2-3 дней побочные действия практически не отмечаются.