Инструкция по применению
Нервохель Таблетки подъязычные гомеопатические 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 50
Срок годности: 36



Описание

Биорегуляционный немецкий препарат. Применяется при повышенной нервной возбудимости, неврозоподобные реакции в климактерическом периоде, нарушения засыпания, нарушения сна.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на 1 таблетку): Активные компоненты: Acidum phosphoricum (Ацидум фосфорикум) D4 60 мг, Ignatia (Игнация) D4 60 мг, Sepia officinalis (Сепия оффициналис) D4 60 мг, Psorinum-Nosode (Псоринум-нозод) D12 60 мг, Kalium bromatum (Калиум броматум) D4 30 мг, Zincum valerianicum (Цинкум валерианикум) D4 30 мг, Вспомогательные вещества: магния стеарат 1,5 мг, лактозы моногидрат до получения массы таблетки около 0,302 г.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Повышенная нервная возбудимость, неврозоподобные реакции в климактерическом периоде, нарушения засыпания, нарушения сна.

Способ применения и дозы

Для взрослых: рассасывать под языком по 1 таблетке 3 раза в день за 30 мин до еды или спустя 1 час после приема пищи. Курс лечения - 2-3 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно после консультации с врачом. Применение препарата у детей от 3 лет возможно по назначению и под контролем врача.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст (до 3 лет). Редкая наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно в случае, если ожидаемая польза для матери превышает риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. При превышении рекомендованных доз необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Назначение комплексных гомеопатических лекарственных средств не исключает применение при данном заболевании других лекарственных средств.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств в отдельных случаях могут временно ухудшиться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

Условия хранения

В сухом месте