Инструкция по применению
Несопин Спрей 0,05 % 20 мл

Характеристики

Форма выпуска: Спрей
Страна: Россия
Производитель: Синтез
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Оксиметазолин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0,05%



Действующее вещество

Оксиметазолин

Состав

В 1 мл.: оксиметазолина гидрохлорид 500 мкг. Вспомогательные вещества: ментол, масло эвкалиптовое, динатрия эдетат, динатрия фосфата додекагидрат, натрия дигидрофосфата дигидрат, пропиленгликоль, бензиловый спирт, вода д/и (до 1 мл).

Форма выпуска

Спрей

Показания

Альфа-адреномиметик для местного применения. Оказывает сосудосуживающее действие. При интраназальном введении уменьшается отечность слизистой оболочки верхних отделов дыхательных путей. Действие проявляется через 15 мин после применения и продолжается в течение 8-12 ч.

Способ применения и дозы

Риниты (аллергической и инфекционно-воспалительной этиологии) . синуситы . евстахиит . сенная лихорадка.

Противопоказания

Взрослым и детям старше 12 лет назначают интраназально по 2-3 впрыскивания в каждый носовой ход с интервалом 10-12 ч. Детям от 6 до 12 лет - по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход с интервалом 10-12 ч.

Применение при беременности и кормлении грудью

В рекомендованной дозировке без консультации с врачом препарат можно использовать не более 3 дней. Следует избегать попадания препарата в глаза. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами: Препарат оказывает влияние на зрение (при попадании в глаза), возможно снижение скорости реакции. В дозировках, превышающих рекомендуемые, может влиять на способность управлять транспортным средством или оборудованием.

Побочные действия

Замедляет всасывание местноанестезирующих лекарственных средств, удлиняет их действие. Совместное назначение других сосудосуживающих лекарственных средств повышает риск развития побочных эффектов. При одновременном назначении ингибиторов МАО и трициклических антидепрессантов возможно повышение АД.

Особые указания

Замедляет всасывание местноанестезирующих лекарственных средств, удлиняет их действие. Совместное назначение других сосудосуживающих лекарственных средств повышает риск развития побочных эффектов. При одновременном назначении ингибиторов МАО и трициклических антидепрессантов возможно повышение АД.