Инструкция по применению
Нетугаст таблетки 200 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: ОЗОН БРЕНДЫ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тримебутин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 200 мг
Срок годности: 36



Описание

Нетугаст — спазмолитический препарат для восстановления нормальной моторики желудочно-кишечного тракта. Действующее вещество — тримебутин.Применяется для симптоматического лечения боли, спазмов и дискомфорта в области живота, ощущения вздутия, моторных расстройств кишечника с изменением частоты стула (диарея или запор), диспепсии, изжоги, отрыжки, а также послеоперационной паралитической кишечной непроходимости.Отпускается без рецепта.

Действующее вещество

Тримебутин

Состав

Действующее вещество (1 таблетка 200 мг): тримебутина малеат — 200,00 мг.
Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат — 123,00 мг, крахмал прежелатинизированный — 45,60 мг, тальк — 3,80 мг, кремния диоксид коллоидный — 3,80 мг, магния стеарат — 3,80 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приёма внутрь тримебутин быстро всасывается из ЖКТ. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1–2 ч. Биодоступность составляет 4–6 %. Период полувыведения — около 12 ч.

Показания

Показания:Симптоматическое лечение боли, спазмов и дискомфорта в области живота;Ощущение вздутия (метеоризм);Моторные расстройства кишечника с изменением частоты стула (диарея или запор);Диспепсия, изжога, отрыжка;Послеоперационная паралитическая кишечная непроходимость.

Способ применения и дозы

Режим дозирования:Взрослым и детям с 12 лет: по 100–200 мг 3 раза в сутки.Для профилактики рецидива СРК: 300 мг в сутки в течение 12 недель.Детям 5–12 лет: по 50 мг 3 раза в сутки.Детям 3–5 лет: по 25 мг 3 раза в сутки.Таблетки принимают внутрь, не разжёвывая, запивая водой.

Противопоказания

Противопоказания:Гиперчувствительность к тримебутину и/или другим компонентам препарата;Редко встречающаяся наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;Детский возраст до 3 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность В доклинических исследованиях не выявлено данных о тератогенности и эмбриотоксичности препарата. Тем не менее в связи с отсутствием необходимых клинических данных применение препарата Нетугаст в период беременности противопоказано. Период грудного вскармливания Не рекомендуется назначать препарат Нетугаст в период лактации в связи с отсутствием достоверных клинических данных, подтверждающих безопасность применения препарата в этот период. При необходимости применения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание. Данные о фертильности отсутствуют.

Побочные действия

Определение частоты нежелательных реакций проводится в соответствии со следующими критериями: очень часто (⩾ 1/10), часто (⩾ 1/100 до нечасто (⩾ 1/1000 до редко (⩾ 1/10000 до очень редко (частота неизвестна (не может быть оценена на основе имеющихся данных). Нарушения со стороны иммунной системы Частота неизвестна: аллергические реакции: кожная сыпь. Нарушения со стороны нервной системы Частота неизвестна: сонливость, усталость, головокружение, головная боль, беспокойство, чувство жара и холода. Желудочно-кишечные нарушения Частота неизвестна: сухость во рту, неприятные вкусовые ощущения, диарея, диспепсия, тошнота, запор. Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей Частота неизвестна: задержка мочи. Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез Частота неизвестна: нарушение менструального цикла, болезненное увеличение грудных желез.

Передозировка

О случаях передозировки препарата Нетугаст до настоящего времени не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Исследования взаимодействия не проводились. Следует информировать лечащего врача обо всех принимаемых лекарственных препаратах.

Особые указания

Курс лечения синдрома раздраженного кишечника в острый период 600 мг в сутки в течение 4-х недель и продолжение лечения после проведенного курса в дозе 300 мг в сутки в течение 12 недель позволяет избежать рецидива заболевания. Препарат не оказывает седативного действия, не влияет на скорость психомоторной реакции и может использоваться у лиц различных профессий, в том числе требующих повышенного внимания и координации движений. Однако, учитывая возможные нежелательные реакции, которые могут влиять на указанные способности (головокружение и другие), следует соблюдать осторожность при управлении автотранспортом и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте.