Инструкция по применению
Никс крем 1% 59 мл

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Италия
Производитель: Хелеон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Перметрин
Количество в упаковке: 1



Действующее вещество

Перметрин

Состав

1 г перметрин 10 мг. Вспомогательные вещества: изопропанол, стеаралкония хлорид, цетиловый спирт, макрогола стеарат, гиэтеллоза, желатин, метилпарагидроксибензоат, бальзам пихты канадской, ароматизатор 06.

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

После накожной аппликации абсорбция перметрина составляет менее 2% в течение первых 48 ч. Поэтому его токсические проявления обычно не рассматривались. Перметрин метаболизируется в коже путем гидролиза с участием эстераз до неактивных метаболитов, которые в основном выводятся из организма через почки. Самый высокий уровень выведения отмечался в течение первых 48 ч, но у некоторых людей было обнаружено очень низкое содержание метаболитов в моче в течение 21 дня после применения крема.

Показания

— лечение педикулеза волосистой части головы (воздействие на вшей и гнид).

Способ применения и дозы

Только для наружного применения. Взрослые (включая пожилых) 1. Вымойте волосы обычным шампунем, тщательно ополосните их водой и высушите полотенцем. 2. Перед использованием встряхните флакон с кремом Никс и, активно втирая, нанесите на голову такое количество крема, которого достаточно для полной обработки волос и кожи волосистой части головы (количество наносимого препарата зависит от длины и толщины волос). Особое внимание необходимо уделить области за ушами и задней части головы. 3. Не смывайте крем Никс в течение 10 мин. 4. Тщательно вымойте волосы водой и высушите полотенцем. 5. Для удаления мертвых вшей и гнид влажные волосы расчешите прилагаемой расческой. Через 7-10 дней проверьте кожу головы на наличие гнид и при обнаружении гнид повторите применение препарата Никс. Дети Применять как у взрослых. Не рекомендуется использовать у детей младше 6 месяцев, исключая случаи назначения препарата данной категории детей врачом. Пациенты с нарушением функции почек : Не требуется корректировки режима дозирования. Пациенты с нарушением функции печени: Не требуется корректировки режима дозирования.

Противопоказания

— гиперчувствительность к перметрину и другим компонентам препарата, а также другим соединениям, относящимся к пиретроидам и пиретринам — острый дерматит волосистой части головы. С осторожностью: беременностьпериод лактациидетский возраст (до 6 месяцев).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода. В период лактации применение препарата возможно только после консультации с врачом.

Побочные действия

Со стороны нервной системы: парестезия. Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки: экзема, отек кожи, покраснение, сыпь, зуд, ощущение жжения, раздражение и дискомфорт кожи, жгучая боль, болезненность кожи. Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Маловероятно, что даже при неправильном применении или излишнем нанесении крема Никс, могут развиться клинически значимые токсические эффекты. Вследствие содержания в препарате изопропилового спирта, теоретически возможно возникновение алкогольной интоксикации при случайном проглатывании препарата маленькими детьми. Симптомы: Наиболее вероятными симптомами, которые могут развиться в первую очередь при случайном приеме препарата внутрь и в редких случаях после нанесения большого количества крема на поверхность кожи, являются головокружение, потеря аппетита, тошнота, рвота, головная боль, слабость, судороги, потеря сознания. Лечение: Симптоматическая терапия. Немедленно обратитесь к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Не обнаружено.

Особые указания

Крем Никс предназначен только для наружного применения. Более 90% пациентов излечивались после 1 применения препарата. Препарат Никс следует использовать только в случае, когда обнаружены живые особи вшей или гнид. Препарат нельзя использовать регулярно/с профилактическими целями. Необходимо обследовать остальных членов семьи и лечить при обнаружении у них вшей или гнид. Перметрин не вызывает раздражения глаз, тем не менее следует избегать его контакта с глазами, так как другие компоненты крема могут вызвать раздражение при попадании в глаза. При случайном попадании крема в глаза их необходимо промыть большим количеством воды или физиологическим раствором. При использовании крема Никс, в том числе медицинским персоналом, можно защитить кожу рук от раздражения с помощью перчаток или вымыть руки после обработки водой с мылом. При появлении симптомов раздражения кожи необходимо проконсультироваться с врачом. В случае появления тяжелых и продолжительных признаков и симптомов раздражения кожи волосистой части головы, неприятных ощущений на коже или других нежелательных эффектов, связанных с применением крема Никс, об этом необходимо сообщить врачу или фармацевту. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и механизмами.