Инструкция по применению
Нимулид Суспензия 50 мг/5 мл 60 мл

Характеристики



Форма выпуска: Гель
Страна: Индия
Производитель: Панацея Биотек
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Нимесулид
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 50 мг/5 мл
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Нимесулид

Состав

5 мл суспензии содержит: Активное вещество: нимесулид 50 мг.

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

После приема внутрь нимесулид хорошо абсорбируется из ЖКТ, Cmax в плазме крови достигается через 1-2 ч. Связывание с белками составляет 99%. После приема внутрь однократной дозы 100 мг нимесулид присутствует в тканях женских половых органов в концентрации, составляющей 40% от концентрации в плазме. Метаболизируется в печени, основной метаболит гидроксинимесулид обладает фармакологической активностью. T 1/2 из плазмы составляет 2-3 ч. Выводится из организма преимущественно с мочой, около 98% дозы выводится в течение 24 ч. При продолжительной терапии кумуляции нимесулида не наблюдается.

Показания

* Ревматоидный артрит; * остеоартроз, остеоартирит; * тендинит, теносиновит; * бурсит; * растяжения связок; * в качестве симптоматической терапии при лечении воспалительных процессов, сопровождающихся болевым синдромом и лихорадкой (в послеоперационном периоде, при травмах, болях в пояснице, при заболеваниях уха, горла и носа /в т.ч. Фарингит, тонзиллит, отит/, при травмах и ранениях мягких тканей, при травмах опорно-двигательного аппарата, в стоматологии /в т.ч. Зубная боль/, в гинекологии); * симптомы лихорадки и воспаления, связанные с инфекциями верхних отделов дыхательных путей (вирусной или бактериальной этиологии).

Способ применения и дозы

Детям Нимулид назначают в форме суспензии для приема внутрь в дозе 1.5 мг/кг массы тела 2-3 раза/сут. Максимальная доза для детей - 5 мг/кг/сут, разделенная на 2-3 приема.

Противопоказания

* Эрозивно-язвенные поражения ЖКТ в фазе обострения; * выраженные нарушения функции печени; * выраженные нарушения функции почек; * беременность; * лактация (грудное вскармливание); * повышенная чувствительность к нимесулиду и другим компонентам препарата, ацетилсалициловой кислоте и другим НПВС.

Применение при беременности и кормлении грудью

Нимесулид противопоказан к применению при беременности и в период лактации. Прямых указаний на эмбриотоксическое и токолитическое действие нимесулида не имеется.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: Со стороны ЦНС: Аллергические реакции: Местные реакции: редко иногда

Передозировка

Передозировка препарата не описана.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможны проявления лекарственного взаимодействия при одновременном приеме внутрь нимесулида с

Особые указания

С осторожностью следует применять внутрь у пациентов с нарушениями функции почек, при артериальной гипертензии, при нарушениях деятельности сердца, нарушениях зрения. При наружном применении требуется контроль врача за состоянием пациентов пожилого возраста с нарушениями функции почек, печени, с застойной сердечной недостаточностью. При применении в педиатрии следует использовать лекарственные формы, предназначенные для детей. У детей в возрасте до 6 лет при применении нимесулида наружно требуется контроль врача. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами В связи с тем, что нимесулид при приеме внутрь может вызывать головокружение и сонливость следует с осторожностью применять его у пациентов, занимающихся потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстрых психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом месте